



Protocol-based Anesthesia Management

เรื่อง : Gynaecologic tumor debulking or surgical staging

ชื่อหน่วยงาน : หน่วยวิสัญญี Gynae

วันที่จัดทำ : 18 ธันวาคม 2567

ผู้ตรวจสอบ : คณะกรรมการงานบริการทางการแพทย์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

1. Preoperative checklist

- Premedication
 - o Paracetamol 1 g +/- COX IK inhibitor oral
 - o Omeprazole 20 mg + metoclopramide 10 mg oral 1 ชั่วโมงก่อนมาห้องผ่าตัด หากมี aspiration risk เช่น ผู้ป่วยมี ascites หรือก่อนขนาดใหญ่กว่า 20 week
 - o ตรวจสอบว่าหากได้รับ thromboembolism prophylaxis เช่น enoxaparin ให้งดก่อนมาห้องผ่าตัด 12 ชั่วโมง หรือ งด 24 ชั่วโมง หากเป็น enoxaparin 40 mg bid
- ตรวจสอบสภาวะของผู้ป่วย เรื่อง anemia, dehydration, electrolyte imbalance, malnutrition
- จองเลือด 2-4 unit หากคาดการณ์ว่า EBL 500 มล. ขึ้นไป หรือ Hb <10 g/dl

2. Intraoperative management

- Choice of anesthesia: GA + epidural block หรือ TAP block พิจารณาทำ rapid sequence induction ในกรณีที่มีขนาดใหญ่
- Position: นอนหงาย กางแขนสองข้าง
- Special monitoring พิจารณาใส่ arterial line หาก estimated blood loss มากกว่า 500 มล.
- มี large bore IV อย่างน้อยหนึ่งเส้น ถ้าเป็นไปได้ควรเปิดน้ำเกลือที่มือซ้าย
- พิจารณาใช้ intermittent pneumatic compression devices (IPCDs)
- PONV prophylaxis: Dexamethasone 4-8 mg หลังนำสลบ
Ondansetron 4-8 mg 30 นาที ก่อนเสร็จผ่าตัด

3. Postoperative management

- Continue thromboprophylaxis