

แนวทางการดูแลผู้ป่วยทารกหลังผ่าตัดเพื่อใส่ระวางภาวะหยุดหายใจหลังผ่าตัดใน หอผู้ป่วยวิกฤต

- **ข้อบ่งชี้**ในการรับผู้ป่วยทารกเข้าดูแลในหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) ให้พิจารณาจาก gestational age และ post conceptual age ดังตาราง

Gestational age (GA)	Postconceptual age (PCA)
≤ 32 สัปดาห์	≤ 60 สัปดาห์
32-35 สัปดาห์	≤ 56 สัปดาห์
35-37 สัปดาห์	≤ 54 สัปดาห์
≥ 37 สัปดาห์	อายุ ≤ 1 เดือน
เด็กทารกแรกเกิดก่อนกำหนด และครบกำหนด ทุกรายที่มีภาวะต่อไปนี้ 1. Hct < 30 2. มีประวัติหยุดหายใจ (apnea) มาก่อน 3. มีโรคทางระบบหายใจ 4. มีโรคทางระบบหัวใจ 5. มีโรคทางระบบประสาท	PCA ≤ 60 สัปดาห์

หมายเหตุ

สำหรับทารกแรกเกิดที่คลอดครบกำหนด (GA ≥ 37 สัปดาห์) และ

- อายุ 1-3 เดือน ควรได้รับการดูแลในหอผู้ป่วยวิกฤตหรือหอผู้ป่วยที่สามารถใส่ระวาง continuous pulse oximetry 24 ชั่วโมง
- อายุ > 3 เดือน สามารถรับการดูแลในหอผู้ป่วยเด็กทั่วไปหรือทำการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอกได้