Loceryl®

amorolfine

NAIL LACQUER

5% อะโมโรลฟิน

ยาทาภายนอกสำหรับรักษาการติดเชื้อราที่เล็บ มือ / เท้า

ขนาดและวิธีการใช้

ทา 5% อะโมโรลฟิน เนล แลคเกอร์ บริเวณเล็บที่ติดเชื้อรา ***สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง*** โดยทำตามรูปขั้นตอนการทาด้านล่าง



1 ก่อนทา อะโมโรลฟิน เนล แลคเกอร์ ครั้งแรก ทำความสะอาดบริเวณที่จะทายา ใช้ตะไบที่ให้มาในชุด ตะไบผิวเล็บออกให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ แต่อย่าตะไบชั้นผิวหนังรอบๆ เล็บ ***ข้อควรระวัง*** ตะไบที่ใช้กับเล็บที่ติดเชื้อราไม่ควรนำมาใช้กับเล็บที่มีสุขภาพดี

2 ทำความสะอาดบริเวณผิวเล็บ ที่ตะไบแล้วด้วยแผ่นทำความสะอาดที่มากับชุด

3 ใช้แท่งพลาสติกจุ่มยาจากขวด ***อย่าป้ายยาที่ปากขวด*** เนื่องจากแท่งพลาสติกจะเป็นตัววัดปริมาณยาที่จะใช้ทา

4 ใช้แท่งพลาสติกที่จุ่มยาแล้วทาให้ทั่วเล็บที่มีการติดเชื้อรา

5 ปิดจุกขวดยาให้แน่น เพื่อป้องกันไม่ให้ยาระเหย

6 ***รอให้ยาที่ทาแห้ง (3-5 นาที)***

7 เมื่อทายาเสร็จเรียบร้อย ให้ทำความสะอาดแท่งพลาสติกที่ใช้ยา และบริเวณคอขวดยาด้วยแผ่นทำความสะอาดเดิมที่ใช้ในข้อ (2) ควรทำตามขั้นตอนข้างต้นทุกครั้งที่ใช้อะโมโรลฟิน เนล แลคเกอร์

ทำตามขั้นตอนที่ 1,2,3 และ 4 สำหรับทุกๆ เล็บที่เป็นเชื้อรา

ในกรณีที่ต้องสัมผัสกับสารตัวทำละลาย เช่น ทินเนอร์ หรือ แอลกอฮอล์ ควรสวมถุงมือเพื่อเป็นการป้องกันยาที่ทาบนผิวเล็บไม่ให้ลอกออก

GALDERMA
Committed to the future of dermatology

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

โทร. 0-27344777 ต่อ 4901 สายตรง โทร. 0-2735-4985