

มูลค่าการสั่งใช้ยาสูงสุด 18 อันดับแรก ในรพ.ศิริราช ประจำปีงบประมาณ 2562 (ผู้ป่วยนอก)

ลำดับที่	ชื่อสามัญ
1	Atorvastatin (40 mg)
2	Tacrolimus (1 mg)*
3	Nilotinib (200 mg)*
4	Macitentan (10 mg)*
5	Levetiracetam (500 mg)*
6	Imatinib (400 mg)*
7	Alfuzosin (10 mg)*
8	Aflibercept inj (2 mg)*
9	Entecavir (0.5 mg)*
10	Nilotinib (150 mg)*
11	Liraglutide inj (18 mg/3 mL)*
12	Deferasirox (250 mg)*
13	Epoetin beta inj (5000 IU)*
14	Leuprorelin inj (11.25 mg)*
15	Sodium hyaluronate 0.18% (0.3 mL)*
16	Lansoprazole (30 mg)*
17	Osimertinib (80)*
18	Bortezomib inj (0.1 mg)*

*ยาต้นแบบ

มูลค่าการสั่งใช้ยาสูงสุด 18 อันดับแรก ในรพ.ศิริราช ประจำปีงบประมาณ 2562 (ผู้ป่วยใน)

ลำดับที่	ชื่อสามัญ
1	Amphotericin B (liposomal) inj (50 mg)*
2	5% Human albumin inj
3	Piperacillin + Tazobactam inj (4.5 g)
4	Rituximab inj (500 mg)*
5	IVIg inj (5 g)
6	20% Human albumin inj
7	Bevacizumab inj (100 mg)*
8	Ped parenteral nutrition
9	Meropenem inj (1 g)
10	Panitumumab inj (100 mg)*
11	Solution for haemofiltration, haemodialysis and haemodiafiltration (5 L)*
12	Pembrolizumab inj (100 mg)*
13	Filgrastim inj (480 mcg)
14	Basiliximab inj (20 mg)*
15	Nicardipine inj (10 mg)*
16	Alteplase inj (50 mg)*
17	Doxorubicin (liposomal) inj (20 mg)
18	0.9% NaCl 100 mL

*ยาต้นแบบ

ภาวะท้องผูกที่รุนแรง จากยา Clozapine

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2563 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. FDA) แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังภาวะท้องผูกที่รุนแรงจากยา clozapine ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไข อาจรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้

Clozapine มีข้อบ่งใช้เพื่อยารักษาโรคจิตเภท (schizophrenia) ที่มี anticholinergic activity มากกว่า ยารักษาโรคจิตเภทอื่น ๆ จึงทำให้เกิดภาวะท้องผูกได้ โดยมีความรุนแรงตั้งแต่อาการท้องผูกทั่วไป (พบบ่อย) จนถึง complete bowel obstruction, paralytic ileus และ intestinal ischemia (พบบ่อย) ทั้งนี้ภาวะท้องผูกจะพบได้มากขึ้นเมื่อใช้ยา clozapine ในขนาดสูง หรือใช้ร่วมกับยาอื่นที่มี anticholinergic activity เช่นเดียวกัน เช่น ยากลุ่ม opioids อย่างไรก็ตาม U.S. FDA ได้รวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 2549 ถึงวันที่ 2 ส.ค. 2559 พบว่ามีผู้ป่วย 10 รายที่เกิดภาวะท้องผูกที่รุนแรงจากยา clozapine ในจำนวนนี้มีผู้ป่วย 5 ราย เสียชีวิต ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์ควรเฝ้าระวังการเกิดภาวะท้องผูกจากยา clozapine หากพบภาวะท้องผูกควรรีบดำเนินการรักษาทันที เพราะหากปล่อยไว้ อาจมีความรุนแรงถึงแก่ชีวิต

เอกสารอ้างอิง
U.S. FDA. FDA strengthens warning that untreated constipation caused by schizophrenia medicine clozapine (Clozaril) can lead to serious bowel problems [Internet]. [cited 2020 February 17]. Available from: <https://www.fda.gov/media/134733/download>

แจ้งเปลี่ยนวิธีการเก็บรักษา Protamine sulfate inj

Protamine sulfate inj 50 mg/5 mL เป็นยาต้านฤทธิ์ของ heparin หรือยาในกลุ่ม low molecular weight heparins (LMWHs) ใช้สำหรับรักษาภาวะที่ได้รับยาเกินขนาด หรือมีเลือดออกในระหว่างการรักษาด้วย heparin หรือยาในกลุ่ม low molecular weight heparins (LMWHs)



อ้างถึงหนังสือจากฝ่ายเภสัชกรรม เลขที่ อว 78.072/เอก317/2563 เรื่อง แจ้งเปลี่ยนวิธีการเก็บรักษา ยา protamine sulfate inj 50 mg/5 mL เนื่องจากเอกสารกำกับยาในปัจจุบัน กำหนดให้เก็บยานี้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ในการนี้งานจัดซื้อและคลังเวชภัณฑ์ ฝ่ายเภสัชกรรม จึงขอแจ้งเปลี่ยนวิธีการเก็บรักษา ยา protamine sulfate inj ดังนี้

เดิม:

เก็บในตู้เย็นชั้นล่าง อุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส

เปลี่ยนเป็น:

เก็บยาที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส

เอกสารอ้างอิง

Product information: Protamine LEO Pharma®, Protamine sulfate, DKSH, Bangkok, Thailand.

ยาเข้าใหม่: KCl Tab 500 mg

อ้างถึงหนังสือจากฝ่ายเภสัชกรรม เลขที่ อว 78.072/เอก223/2563 เรื่อง แจ้งรายการยา Addi-K® Tab 750 mg เลิกจำหน่าย และแจ้งจำหน่ายรายการยา Potassium Chloride® Tab 500 mg (Pond's) จึงขอสรุปความแตกต่างของยาทั้งสองรายการในตารางต่อไปนี้

รายการยาเลิกจำหน่าย	รายการยาเพื่อพิจารณาเลือกใช้
Addi-K® Tab 750 mg	Potassium Chloride® Tab 500 mg (Pond's)
รูปแบบยา	
Sustained release tablet	Compressed tablet
ปริมาณ potassium ต่อ 1 เม็ด	
10 mEq (393 mg)	6.7 mEq (263.31 mg)
บัญชียา	
NED	ED (ก)

**** ปริมาณ potassium ในรายการยาเลือกใช้ ไม่เท่ากับรายการยาเดิมที่เลิกจำหน่าย จึงขอให้แจ้งแพทย์ทราบเพื่อพิจารณาก่อนทุกครั้ง**

สอบถามข้อมูลยาและพิษวิทยา โทร 9 - 7007
สอบถาม Medication Reconciliation (MR) โทร 9 - 6964
สอบถามเรื่องแพ้ยา และประวัติการแพ้ยา โทร 9 - 9555



มีอะไรในฉบับนี้

- ❖ มูลค่าการสั่งใช้ยาสูงสุด 18 อันดับแรก ในรพ.ศิริราช ประจำปีงบประมาณ 2562 (ผู้ป่วยนอก)
- ❖ มูลค่าการสั่งใช้ยาสูงสุด 18 อันดับแรก ในรพ.ศิริราช ประจำปีงบประมาณ 2562 (ผู้ป่วยใน)
- ❖ ภาวะท้องผูกที่รุนแรงจากยา Clozapine
- ❖ แจ้งเปลี่ยนวิธีการเก็บรักษา Protamine sulfate inj
- ❖ ยาเข้าใหม่: KCl Tab 500 mg

ปีที่ 19 ฉบับที่ 6

เดือนมีนาคม 2563