

รายการยารักษา COVID-19 ที่มีในรพ.ศิริราช

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า/ความแรง
Lopinavir/Ritonavir*	Aluvia® tab (100/25 mg) Lopinavir/ritonavir GPO® tab (200/50 mg) Lopinavir/ritonavir GPO® oral solution (80/20 mg/mL)
Darunavir*	Prezista® tab (600 mg) Darutab® tab (600 mg)
รับประทานร่วมกับ Ritonavir*	Norvir® tab (100 mg) Rinavir® tab (100 mg)
Favipiravir**	Avigan® tab (200 mg)
Chloroquine phosphate	Nitaquin® tab (250 mg)
Hydroxychloroquine	Plaquenil® tab (200 mg) Zyquenil® tab (200 mg)
Azithromycin	Floctil® cap (250 mg) Onzet® powder for oral suspension (200 mg/5 mL)

หมายเหตุ: * จำกัดรายชื่อยาแพทย์ผู้มีสิทธิสั่ง

** จำกัดรายชื่อยาแพทย์ผู้มีสิทธิสั่ง และต้องมี

เอกสารประกอบการสั่งจ่าย

สามารถศึกษาแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย

ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อ

ในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์

และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 8 เมษายน 2563

ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ที่ QR code นี้



Influenza vaccine 2020 (Southern strain) มาแล้ว



วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2020 (southern strain) ที่เข้ามาใหม่ในรอบนี้ มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ของไวรัส ที่นำมาทำวัคซีน ดังนี้

สายพันธุ์ใหม่	สายพันธุ์เก่า
Influenza vaccine 2020 (Southern strain)	Influenza vaccine 2019-2020 (Northern strain)
*A/Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm09-like virus	*A/Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm09-like virus
*A/South Australia/34/2019 (H3N2)-like virus	*A/Kansas/14/2017 (H3N2)-like virus
*B/Washington/02/2019-like (B/Victoria lineage) virus	*B/Colorado/06/2017-like virus (B/Victoria/2/87 lineage)
*B/Phuket/3073/2013-like (B/Yamagata lineage) virus	*B/Phuket/3073/2013-like virus (B/Yamagata/16/88 lineage)

เอกสารอ้างอิง

WHO. WHO recommendations on the composition of influenza virus vaccines [online]. Available at: <https://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/en/>. Accessed on Mar 31, 2020

ความผิดปกติทางอารมณ์ และพฤติกรรม จากยา montelukast

วันที่ 4 มีนาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. FDA) ได้แจ้งเตือนแก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยที่ใช้ยา montelukast ให้ระมัดระวัง และเฝ้าติดตามอาการ-ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา montelukast เนื่องจากยานี้อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ และพฤติกรรมอย่างรุนแรง ได้แก่ อารมณ์แปรปรวน และมีความคิดอยากฆ่าตัวตาย

ทั้งนี้ U.S. FDA มีคำแนะนำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ดังนี้

1. สอบถามประวัติการป่วยด้วยโรคทางจิตเวชก่อนทุกครั้ง ในผู้ป่วยที่จะเริ่มการรักษาด้วยยา montelukast
2. ประเมินประโยชน์ในการรักษาด้วยความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการใช้ยา montelukast ทั้งในผู้ป่วยที่กำลังจะเริ่มยา และผู้ป่วยที่ใช้ยานี้อยู่แล้ว
3. แจ้งให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลติดตามอาการผิดปกติทางอารมณ์และพฤติกรรมจากการใช้ยา montelukast หากพบความผิดปกติดังกล่าวเกิดขึ้น แนะนำให้หยุดยา montelukast และรีบมาพบแพทย์ทันที

เอกสารอ้างอิง

U.S. FDA. Singulair (montelukast) and All Montelukast Generics: Strengthened Boxed Warning - Due to Restricting Use for Allergic Rhinitis. [cited 4 March 2020]. Available from: <https://www.fda.gov/safety/medical-product-safety-information/singulair-montelukast-and-all-montelukast-generics-strengthened-boxed-warning-due-restricting-use>

Creon® : บริหารยาอย่างไร หากกลืนยาลำบาก

Creon® (pancreatin) เป็นยาในรูปแบบแคปซูลสำหรับรับประทาน ภายในบรรจุด้วย gastro-resistant granules สำหรับใช้ในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ที่มีภาวะตับอ่อนผลิตเอนไซม์ไม่เพียงพอต่อการย่อยอาหาร โดยมักมีสาเหตุจาก cystic fibrosis ตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง การตัดกระเพาะอาหาร มะเร็งตับอ่อน ท่อน้ำดีหรือท่อตับอ่อนอุดตัน เป็นต้น

- ขนาดยาขึ้นกับความรุนแรงของโรคและอาหารที่รับประทานในผู้ป่วยแต่ละราย
- แนะนำให้รับประทานยาระหว่างหรือหลังมื้ออาหารทันที และดื่มน้ำตามให้มากพอ
- ห้ามบดหรือเคี้ยวเม็ดยา
- ในผู้ป่วยที่มีปัญหาการกลืนยาลำบาก เช่น เด็กหรือผู้สูงอายุ ให้เปิดแคปซูลอย่างระมัดระวัง แล้วเท granules ที่บรรจุภายในแคปซูลลงในอาหารที่เป็นกรดอ่อนๆ (pH < 5.5) หรือรับประทานร่วมกับของเหลวที่เป็นกรดอ่อนๆ (pH < 5.5) เช่น โยเกิร์ต น้ำผลไม้ แล้วกลืนโดยไม่ต้องเคี้ยว หลังผสมแล้วให้ใช้ทันที ไม่ควรเก็บไว้ใช้ครั้งหน้า
- Granules ภายในแคปซูลถูกเคลือบไว้ด้วยสารที่ทำให้ยาไปแตกตัวที่ลำไส้เล็ก (enteric coating) การทำลายสารที่เคลือบไว้นี้จะทำให้ยาถูกปลดปล่อยในช่องปาก อาจทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลงและระคายเคืองเยื่อเมือก

เอกสารอ้างอิง

Creon® 10000 [package insert]. Germany: Abbott Laboratories GmbH; 2014

ปริมาณวิตามิน A และ D ใน Multivitamin Tab (GPO)

สืบเนื่องจากหนังสือฝ่ายเภสัชกรรม เลขที่ อว 78.072/เอก634/2563 ได้แจ้งคำแนะนำวิธีรับประทานยา Multivitamin Tab (GPO) เนื่องด้วยเป็นยาที่เข้ามาจำหน่ายชั่วคราว เพื่อให้แพทย์พิจารณาเลือกใช้แทนยา Multivitamin Tab (Greater Pharma) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงคุณภาพ จึงขอเปรียบเทียบปริมาณวิตามินใน 1 เม็ดของยาทั้งสองรายการในตารางต่อไปนี้

ปริมาณ วิตามิน ใน 1 เม็ด	Multivitamin Tab (GPO)	Multivitamin Tab (Greater Pharma)
Vitamin A	2500 IU	1500 IU
Vitamin D	300 IU	100 IU
Vitamin B ₁	1 mg	1 mg
Vitamin B ₂	0.5 mg	0.5 mg
Vitamin C	15 mg	15 mg
Nicotinamide (Niacinamide)	7.5 mg	7.5 mg

* Multivitamin Tab (GPO) รับประทานวันละไม่เกิน 2 เม็ด หากพบการส่งจ่ายยานี้มากกว่าวันละ 2 เม็ด ต้องยืนยันวิธีรับประทานยากับแพทย์ผู้สั่งอีกครั้ง

สอบถามข้อมูลยาและพิษวิทยา โทร 9 - 7007

สอบถาม Medication Reconciliation (MR) โทร 9 - 6964

สอบถามเรื่องแพ้ยา และประวัติการแพ้ยา โทร 9 - 9555



มีอะไรในฉบับนี้

- ❖ รายการยารักษา COVID-19 ที่มีในรพ.ศิริราช
- ❖ Influenza vaccine 2020 (Southern strain) มาแล้ว
- ❖ ความผิดปกติทางอารมณ์ และพฤติกรรม จากยา montelukast
- ❖ Creon® : บริหารยาอย่างไร หากกลืนยาลำบาก
- ❖ ปริมาณวิตามิน A และ D ใน Multivitamin Tab (GPO)

ปีที่ 19 ฉบับที่ 7

เดือนเมษายน 2563