

## Cloxacillin sodium inj.

Cloxacillin injection เป็นยาที่ทำให้เกิด

phlebitis ได้ง่าย จึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษ

วิธีบริหารยา สามารถบริหารยานี้ได้โดยการฉีดเข้า

กล้ามเนื้อ (IM) หรือฉีดเข้าหลอดเลือดดำ (IV push) โดย

ใช้เวลาอย่างน้อย 2-4 นาที หรือหยดเข้าหลอดเลือดดำ

(IV infusion) โดยใช้เวลาอย่างน้อย 30-40 นาที

วิธีเตรียมยา ละลายผงยาด้วย sterile water

for injection ตามปริมาณที่กำหนดในตาราง และ

สามารถเก็บน้ำยาที่ละลายแล้วในตู้เย็นได้นาน 48 ชั่วโมง

ขนาดยา	ปริมาณ sterile water for injection (ml)	ความเข้มข้น โดยประมาณ (mg/ml)
500 mg IV	4.8	100
1 g IV	9.6	100

เนื่องจากยาฉีด Cloxacillin sodium มีอาการข้างเคียงที่พบได้บ่อย คือ หลอดเลือดดำอักเสบ (phlebitis) ดังนั้น

ในทางปฏิบัติจึงแนะนำให้บริหารยาโดยการหยดเข้า

หลอดเลือดดำ (IV infusion) เวลาอย่างน้อย 30-40

นาทีโดยเจือจางน้ำยาที่ละลายแล้วใน Sodium chloride

0.9% อย่างน้อย 100 ml เพื่อลดอาการดังกล่าว

## Xylocard® injection เลิกผลิต

งานผลิตยาปราศจากเชื้อ ฝ่ายเภสัชกรรม แจ่ง

การผลิตยา 2% Lidocaine injection ขนาด 5 mL

(non preservative) เพื่อใช้แทนยา Xylocard® ที่เลิก

ผลิต โดย code SAP คือ 2004537 รหัส HIS คือ

LIDI25 ราคาขาย 35 บาท

## แจ่งยาขาด

- ❖ Fluimucil Antibiotic 500 mg.
- ❖ Alphanate® (Factor8) Inj.250 IU/5mL
- ❖ Prednisil Eye drops 4 mL
- ❖ Elmetacin Spray(Ext) 50 mL
- ❖ Clinomel N4-550 Infusion 2000 mL

## แจ่งยาเลิกผลิต

- ❖ Cialis tab 10 mg
- ❖ Catapress tab 0.15 mg
- ❖ Catapress tab 0.075 mg
- ❖ Mevalotin tab 10 mg

## เซรุ่มแก้พิษงู

ขณะนี้ฝ่ายเภสัชกรรมมีเซรุ่มแก้พิษงูครบ 7

ชนิดแล้ว ได้แก่ เซรุ่มแก้พิษงูเห่า (Cobra) งูเขียวหาง

ไหม้ (Green Pit Viper) งูแมวเซา (Russel's Viper)

งูสามเหลี่ยม (Banded krait) งูทับสมิงคลา (Malayan

krait) งูกะปะ(Malayan Pit Viper) งูจงอาง (King

Cobra)

สามารถเบิกยาได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ห้องยา

รวม 103

## ระวังผิด

ระวังสับสน !!!

Sulperazon 1 g ต่างกับ Sulperazon 1.5 g

Sulperazon 1 g (มียา generic คือ Sulcef®)

ประกอบด้วย cefoperazone Na 0.5 g และ

sulbactam Na 0.5 g

แต่ Sulperazon 1.5 g (ไม่มียา generic)

ประกอบด้วย cefoperazone Na 1 g และ

sulbactam Na 0.5 g



# อุปกรณ์ตัดเม็ดยา

เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถแบ่งครึ่งเม็ดยาได้สะดวก ฝ่ายเภสัชกรรมจึงจัดหาอุปกรณ์ในการแบ่งครึ่งเม็ดยาเพื่อจำหน่ายแก่ผู้ป่วยแล้ว ในราคาชิ้นละ 60 บาท (เป็นอุปกรณ์ที่เบิกเงินคืนไม่ได้)

ยาที่สามารถแบ่งครึ่งได้ ได้แก่

1. ยาที่มีดัชนีการรักษากว้าง เมื่อให้ยามากหรือน้อยเกินไปเล็กน้อยไม่ส่งผลต่อการรักษาอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ยาลดไขมันในเลือด ยาขับปัสสาวะ ยาแก้แพ้ เป็นต้น
2. ยาที่ออกฤทธิ์นานที่แบ่งครึ่งได้แต่ห้ามบด ห้ามเคี้ยว ได้แก่ Tegretol CR, Zeptol CR, Cardil CR, Imdur, Depakine Chrono, Nuelin SR, Isoptin SR

ยาที่ห้ามแบ่งครึ่ง ได้แก่

1. ยาที่ดูดความชื้นได้ง่ายเมื่อแบ่งทิ้งไว้นานๆ ได้แก่ Enalapril (Renitec, Enaril, Monopril, Anapril) Telmisartan (Micardis, Micardis plus)
2. ยาเคมีบำบัด ยาเคลือบเพื่อให้ออกฤทธิ์ที่ลำไส้ ยาเคลือบเพื่อให้ออกฤทธิ์เนิ่น ดังตารางขวามือ

# ยาที่ห้ามแบ่งครึ่ง

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า
Aspirin	Infarcad®(60 mg)
Aspirin	Aspent® (300 mg)
Bisacodyl	Dulcolax® (5 mg)
Bupropion	Quomem®
Busulfan	Myleran®
Chlorambucil	Leukeran®
Cyclophosphamide	Endoxan®
Diclofenac	Voltaren SR®
Diclofenac	Voltaren® , Dosanac®
Didanosine	Videx EC®
Diltiazem	Dilem SR®
Felodipine	Plendil®
Gliclazide	Diamicron MR®
Indapamide	Natrilix SR®
Isosorbide dinitrate	Isordil® (5 mg)
Potassium Chloride	Addi-K®
Loratadine + Pseudo ephedrine	Clarinase®
Mercaptopurine (6-MP)	Puri-nethol®
Nifedipine	Adalat CR®
Pentoxifylline	Trental®
Phenytoin	Dilantin® 100 mg Kapseal
Serratiopeptidase	Danzen® , Rodase®
Sodium Valproate	Depakine® 200 mg
Sulfasalazine	Salazopyrin EN®
Tramadol	Tramal Retard®
Verapamil	Verapin SR®

# ศิริราชเภสัชสาร



- ❖ การลด Phlebitis จาก Cloxacillin inj.
- ❖ Xylocard inj. ขาด ใช้อะไรแทน
- ❖ แจ้งรายการยาขาดชั่วคราว
- ❖ แจ้งรายการยาเลิกผลิต
- ❖ อุปกรณ์ตัดเม็ดยามีจำหน่ายแล้ว
- ❖ ยาที่แบ่งครึ่งได้ และยาที่ห้ามแบ่งครึ่ง

ท่านสามารถอ่านศิริราชเภสัชสารฉบับย้อนหลัง  
ตั้งแต่ปี 2548 ได้ทุกฉบับ ที่ เว็บไซต์  
[http://www.si.mahidol.ac.th/km/cops/medication\\_safety](http://www.si.mahidol.ac.th/km/cops/medication_safety)

ปีที่ 5 ฉบับที่ 8  
พฤษภาคม 2549