

ยา Nimesulide กับภาวะตับอักเสบ แนวทางการเปลี่ยนยาในกลุ่ม ACEIs

ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้แจ้งเวียนจดหมายข่าว ฉบับที่ 3/2551 เรื่อง ยา Nimesulide (Nidol®) กับภาวะตับอักเสบ สืบเนื่องจากคณะกรรมการแห่งชาติด้านยา ประเทศไอร์แลนด์ ได้สั่งระงับการจำหน่ายและเรียกคืนยา Nimesulide (Nidol®) รูปแบบรับประทาน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เนื่องจากพบการเกิด Fulminant hepatic failure ในผู้ป่วยที่ใช้ยานี้และต่อมาได้มีการระงับหรือควบคุมการจำหน่ายในบางประเทศ

สำหรับประเทศไทย จากการพิจารณาของคณะกรรมการศึกษาและเฝ้าระวังอันตรายจากการใช้ยา ได้ข้อสรุปว่ายา Nimesulide (Nidol®) มีการเกิดพิษต่อดับจริง แต่เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนของการเกิดอุบัติการณ์ในประเทศไทย ประกอบกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน และสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีความเห็นว่ายาดังกล่าวยังมีประโยชน์ในประเทศไทย

ดังนั้น เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ป่วย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอความร่วมมือบุคลากรทางการแพทย์ให้สั่งใช้ยา Nimesulide ด้วยความระมัดระวัง และมีการติดตามผู้ป่วยหลังใช้ยา ในกรณีที่พบอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการใช้ยา Nimesulide โปรดแจ้งศูนย์แพทย์ รพ.ศิริราช โทร. 9555

หากแพทย์ต้องการเปลี่ยนยาในกลุ่ม ACEI จากตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง แนะนำให้เทียบขนาดยาตามตารางดังนี้

Generic name	Conversion dose ¹				
Captopril ³	6.25 mg tid	12.5 mg tid	25 -37.5 mg tid	50 mg tid	100 -150 mg tid
Enalapril ^{2,3}	5 mg OD	10 mg OD	20 mg OD	20 mg bid	N/A
Lisinopril	5 mg OD	10 mg OD	20 mg OD	40 mg OD	40 mg bid
Ramipril	1.25 mg OD	2.5 mg OD	5 mg OD	10 mg OD	N/A
Fosinopril	5 mg OD	10 mg OD	20 mg OD	40 mg OD	80 mg OD
Quinapril	5 mg OD	10 mg OD	20 mg OD	40 mg OD	N/A

¹โดยทั่วไปการใช้ ACEIs เพื่อการรักษา Congestive Heart Failure (CHF) และ Left-ventricular dysfunction จะให้ยารวันละ 2 ครั้ง

²Enalapril ที่ขนาดยามากกว่า 20 มก./วัน ควรแบ่งให้วันละ 2 ครั้ง

³เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

อ้างอิง : <http://aeholland.com/ticaceinhibitors40.pdf>.

Accessed on July 8, 08

ยกเลิกจำหน่ายยา GPOvir S40 และ Stavudine 40 mg Capsule

องค์การเภสัชกรรม ได้แจ้งยกเลิกจำหน่ายยา GPOvir S40 และ Stavudine 40 mg Capsule เนื่องจากเป็นยาที่มีการใช้น้อย และการใช้ยาที่มีปริมาณ Stavudine ขนาดสูง จะเพิ่มโอกาสเกิด Lipodystrophy ได้มาก ดังนั้น ยาที่มีในโรงพยาบาลขณะนี้ จึงได้แก่

ชื่อสามัญทางยา	ชื่อการค้า
d4T 30 mg + 3TC 150 mg + NVP 200 mg	GPOvir S30
AZT 250 mg + 3TC 150 mg + NVP 200 mg	GPOvir Z250
d4T 15 mg หรือ 20 mg หรือ 30 mg	Stavir 15 ,20 และ 30 mg

ยาใหม่ที่เป็นยาเลียนแบบ

ชื่อการค้า	ชื่อสามัญทางยา	บัญชียา
Nelin [®] Injection 100 mg/2 mL และ 150 mg/1.5 mL	Netilmycin (แทน Netromycin [®])	ง
Quinartil [®] Tablet 5 mg	Quinapril HCl (แทน Accupril [®])	NED
Samnir [®] Suspension 125 mg/5 mL	Cefdinir (แทน Omnicef [®])	ง
Utmos [®] Tablet 30 mg	Pioglitazone HCl (แทน Actos [®])	ง
Caraten [®] Tablet 6.25 mg	Carvedilol (แทน Dilatrend [®])	NED
Intril SR [®] tablet 1.5 mg	Indapamide (แทน Natrilix XR [®])	NED

ยาใหม่

ชื่อการค้า	ชื่อสามัญทางยา	บัญชียา
Yaz [®] Tablet	Ethinylestradiol 0.02 mg + Drospirenone 3 mg	NED
Eprex [®] Injection 20,000 IU	Erythropoietin Alpha	NED
Remifemin [®]	Cimicifuga racemosa extract 20 mg	NED
Cavumox ES [®] Syrup 600 mg/5 mL	Amoxicillin trihydrate + Clavulanate	NED
ICaps AREDS [®] Tablet	Multivitamin	NED



มีอะไรในฉบับนี้

- ❖ ยา Nimesulide กับภาวะตับอักเสบ
- ❖ แนวทางการเปลี่ยนยากกลุ่ม ACEIs
- ❖ ยกเลิกจำหน่ายยา GPO Vir S40 และ Stavudine 40 mg
- ❖ ยาใหม่ที่เป็นยาเลียนแบบ
- ❖ ยาใหม่
- ❖ Sulfonylurea Dosage Conversion

Sulfonylurea dosage conversion

Drug	Equivalent Daily Dose (mg)
Glimepiride	2
Glipizide	5-10
Glibenclamide	2.5-5

อ้างอิง:

<http://hosp.uky.edu/pharmacy/formulary/formtools/sulfonylurea.htm>

Accessed Jul15, 08

ปรึกษาเรื่องยา หรือสารพิษ

โทร 7007 ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยเภสัชกรและอาจารย์แพทย์พิษวิทยา

ปีที่ 7 ฉบับที่ 8

เดือนมิถุนายน 2551