

# ยา Aspirin ที่มีในโรงพยาบาลศิริราช

Aspirin ที่มีจำหน่ายในโรงพยาบาลศิริราช มีดังนี้

ชื่อการค้า	ปริมาณ Aspirin (mg)	รูปแบบ
B-Aspirin	81	Enteric coated tablet
Cardiprin 100	100	Plain tablet
Aspent	300	Enteric coated tablet
Aspirin	325	Plain tablet

หมายเหตุ : ยา Aspirin ที่ตัดออกจากรายการยา  
โรงพยาบาลศิริราช แล้ว ได้แก่ Asa tab 60 mg  
และ Aspillets tab 80 mg

# ไม่มียา Valcyte ในโรงพยาบาลศิริราช

ไม่มีตัวยา Valganciclovir (Valcyte®) ในศิริราช สำหรับ  
ยา Antiviral agents ที่เป็นยารับประทาน ที่มี คือ  
Aciclovir tab (Zovirax®, Vilerm®) 200, 400, 800 mg  
และ Valaciclovir tab (Valtrex®) 500 mg เท่านั้น

# Ivermectin tab มาแล้ว !!!

ขณะนี้มียา Ivermectin tab (Vermectin®) ใน  
โรงพยาบาลศิริราช แล้ว ในขนาดเม็ดละ 6 mg ราคาเม็ด  
ละ 97 บาท

โดยขนาดยาสำหรับโรคติดเชื้อปรสิตมีดังนี้

*Ascariasis* ใช้ขนาด 50 – 200 mcg/Kg ครั้งเดียว

*Cutaneous Larva Migrans* โดยใช้ในขนาด  
150 – 200 mcg/ Kg ครั้งเดียว

*Intestinal strongyloidiasis* โดยใช้ในขนาด  
200 mcg/ Kg ครั้งเดียว

\*\*\*\*\* ยานี้ไม่แนะนำให้ใช้ในเด็กที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่า  
15 กิโลกรัม และควรรับประทานยาก่อนอาหาร  
1 ชั่วโมง \*\*\*\*\*

# การรายงานปัญหาคุณภาพยา !!

ช่วงนี้เป็นช่วงต้นปีงบประมาณ 2552 ที่มีรายการยา  
ใหม่ ๆ เข้ามามาก บางรายการเพิ่งมีการนำมาใช้ในศิริราช  
เป็นครั้งแรก บุคลากรที่พบปัญหาคุณภาพยา เช่น ผสม  
ยาผิดแล้วไม่ละลายตามที่ระบุไว้ พบสารแขวนลอยในยา  
ฉีดน้ำใส ยาเปลี่ยนสี ปัญหาภาชนะบรรจุ สามารถ  
download แบบฟอร์ม “รายงานปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ  
ผลิตภัณฑ์ยา/เวชภัณฑ์ (วัสดุทางการแพทย์) ใน  
โรงพยาบาล” ได้จาก SINET> ฝ่ายเภสัชกรรม>

ประกาศ> แบบฟอร์มต่างๆ และส่งรายงานพร้อมตัวอย่าง  
ผลิตภัณฑ์มาที่ หน่วยจัดซื้อและตรวจสอบคุณภาพ

ฝ่ายเภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2

# ความคงตัวหลังเปิดใช้ของยาชาเฉพาะที่ Lidocaine Inj.

การกำหนดความคงตัวหลังเปิดใช้ยาชาเฉพาะที่  
( Lidocaine inj ) ในแต่ละชื่อการค้ามีความคงตัวแตกต่างกัน  
(ภายใต้ Aseptic technique) ให้กำหนดตามข้อมูล  
การศึกษาของบริษัทผู้ผลิต ดังนี้

ชื่อการค้า	บริษัท	ความคงตัวหลังเปิดใช้
Xylocaine injection 1% , 2%	Astra Zeneca	เก็บได้ 3 วัน ที่อุณหภูมิห้อง
Xylocaine injection 1%, 2% <i>with adrenaline</i>	Astra Zeneca	เก็บได้ 3 วัน ที่อุณหภูมิห้อง
Lidocaine Hydrochloride injection 1% , 2%	องค์การ เภสัชกรรม	เก็บได้ 14 วัน ที่อุณหภูมิห้อง
Drocanil-A injection 1% , 2% <i>with adrenaline</i>	M&H manufact uring	** เก็บได้ 1 วัน ที่อุณหภูมิห้อง ** เก็บได้ 7 วัน ที่อุณหภูมิ 2-8 °C

## ความคงตัวหลังเปิดใช้ของ Metrogyl inj

Metrogyl® inj. ชื่อสามัญทางยา คือ Metronidazole 500 mg การบริหารยาโดยการให้ทาง IV infusion อัตราเร็วการให้ยาสูงสุด 5 mL/นาที **หลังเปิดใช้** **บริษัทผู้ผลิตไม่แนะนำให้เก็บไว้ใช้ต่อ** ถ้าใช้ไม่หมดให้ทิ้งไป เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ เป็นแบบปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว (Single use product) เมื่อถูกเปิดใช้แล้วจะสูญเสีย สภาวะปราศจากเชื้อ (sterility) อาจเกิดการปนเปื้อนได้

## Gentamicin cream ตัดออกจากบัญชียาโรงพยาบาล

คณะกรรมการยาต้านจุลชีพ มีมติให้ตัดตำรับยา *Gentamicin cream* ออกจากบัญชีโรงพยาบาล เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดผล Systemic effect และทำให้เกิดการแพ้ได้ง่าย ทั้งนี้ยังมียาต้านจุลชีพ ชนิดใช้ภายนอกให้เลือกใช้อื่น ได้แก่ Mupirocin cream, Silver zinc sulfadiazine cream, Fusidic acid cream และ Chloramphenicol eye ointment

## โรคติดเชื้อฉวยโอกาสจากการใช้

Once-Weekly  
**RAPTIVA®**  
efalizumab

ได้มีคำเตือนเกี่ยวกับการใช้ยา Efalizumab ซึ่งเป็นยาฉีดที่ใช้ในโรค Moderate to severe Chronic Plaque Psoriasis ว่าให้ **ระวังโรคติดเชื้อฉวยโอกาสขั้นรุนแรง** เช่น Bacterial sepsis, Viral meningitis และ Invasive fungal infection นอกจากนั้นแล้ว **ยานี้ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปี**

ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันผิดปกติอยู่เดิมจำเป็นต้องแจ้งแพทย์ ถ้าจำเป็นต้องใช้ยานี้ และแพทย์จำเป็นต้องให้วัคซีนป้องกันในโรคที่จำเป็นตามวัยของผู้ป่วยก่อนที่จะเริ่มให้ยา Efalizumab

เอกสารอ้างอิง :

<http://www.fda.gov/medwatch/safety/2008/safety08.htm#Raptiva>

Accessed on Oct 18, 08

ปรึกษาเรื่องยาและพิษวิทยา ติดต่อ  
หน่วยข้อมูลยาและพิษวิทยา  
โทร.7007 ตลอด 24 ชั่วโมง



มีอะไรในฉบับนี้

- ❖ ขนาดยา Aspirin ที่มีใน ร.พ.ศิริราช
- ❖ ไม่มียา Valganciclovir (Valcyte®) จำหน่ายใน ร.พ.ศิริราช
- ❖ ยา Ivermectin tab มาแล้ว !!
- ❖ การรายงานปัญหาคุณภาพยา/เวชภัณฑ์
- ❖ ความคงตัวหลังเปิดใช้ของยาชาเฉพาะที่ Lidocaine Inj.
- ❖ ความคงตัวหลังเปิดใช้ของยา Metrogyl Inj.
- ❖ Gentamicin cream ตัดออกจาก ร.พ.ศิริราช
- ❖ โรคติดเชื้อฉวยโอกาสจากการใช้ยา Efalizumab inj. (Raptiva®)

ปีที่ 7 ฉบับที่ 12  
เดือนตุลาคม 2551