

Zefxon[®] for IV push/IV infusion

การเตรียมน้ำยาและบริหารยา Omeprazole inj.
(Zefxon[®])

*** ยา Zefxon[®] ต้องละลายด้วยสารละลายที่แนบมา
ไว้ในกล่องเท่านั้น ***

IV push

1. ละลายผงยาด้วยสารละลายที่แนบมาให้ในกล่อง 10 mL (ความคงตัวหลังผสม สามารถเก็บที่อุณหภูมิห้อง 4 ชั่วโมง)
2. ฉีดเข้าเส้นเลือดดำช้าๆ ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 5 นาที

IV infusion

1. ละลายผงยาด้วยสารละลายที่แนบมาให้ในกล่อง 10 mL
2. เจือจางด้วย NSS หรือ D5W 40 mL โดยความคงตัวหลังเจือจางด้วย NSS สามารถเก็บที่อุณหภูมิห้อง 12 ชั่วโมง และความคงตัวหลังเจือจางด้วย D5W สามารถเก็บที่อุณหภูมิห้อง 6 ชั่วโมง
3. นำไป IV infusion ใช้เวลานาน 10-30 นาที

IV continuous infusion (8 mg/hr)

1. ละลายผงยาด้วยสารละลายที่แนบมาให้ในกล่อง 10 mL

2. เจือจางด้วย NSS หรือ D5W 40 mL
3. นำไป IV continuous infusion ครั้งละ 40 mg ใช้เวลานาน 5 ชั่วโมง

การทำ Whole bowel irrigation

- เตรียมของเหลวสำหรับทำ Whole bowel irrigation โดยละลายผงยา Colon Prep.[®] โดยใช้น้ำในอัตราส่วน 1 ซองต่อน้ำ 750 mL
- บริหารยาโดยการดื่ม หรือให้ผ่าน Nasogastric tube ในอัตราเร็ว 2 ลิตรต่อชั่วโมง (เด็กให้ในอัตราเร็ว 500 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง หรือ 35 mL ต่อกิโลกรัมต่อชั่วโมง) ให้ยาจนกระทั่งถึงจุดยุติ คือ เมื่อของเหลวที่ผู้ป่วยถ่ายออกมาทางทวารหนัก มีลักษณะใส หรือไม่มีสารพิษออกอีกต่อไป หรือกรณีที่มีการถ่ายภาพ X-ray ก่อนทำ Whole bowel irrigation ควรทำจนกระทั่งภาพถ่าย X-ray นั้นหายไป
- หากให้สารละลายของ Colon Prep.[®] ไปแล้ว 8-10 ลิตร (เด็ก 150-200 mL ต่อกิโลกรัม) แล้วยังไม่ถึงจุดยุติให้หยุดทำ Whole bowel irrigation



มีอะไรในฉบับนี้

- ◆ ตัวยาจากยา Leflunomide
- ◆ ยาเบาหวานตัวใหม่ Galvus[®] (Vildagliptin) 50 mg Tab.
- ◆ การบริหารยา Metoclopramide Inj.
- ◆ การบริหารยา Zefxon[®] Inj.
- ◆ การทำ Whole bowel irrigation

ปีที่ 9 ฉบับที่ 9
เดือนกรกฎาคม 2553

สอบถามข้อมูลยาและพิษวิทยา
ติดต่อ หน่วยข้อมูลยาและพิษวิทยา
โทร. 0-2419-7007