

Cephalosporins ในศิริราช

Generation / ชื่อทั่วไป (บัญญัติยา)	รายการยาในโรงพยาบาล	
	รูปแบบ	ชื่อการค้า/ความแรง
First		
Cephalexin (ED)	ยากิน	Sialexin cap 250 mg
		Sialexin cap 500 mg
		Keflex cap 500 mg
		Toflex syr 250 mg/5 mL (60 mL)
Cefazolin sodium (ED)	ยาฉีด	Zefa M.H. inj 1 g
Second		
Cefaclor (non-ED)	ยากิน	Distaclor cap 500 mg
		Distaclor MR tab 375 mg
Cefminox (non-ED)	ยาฉีด	Meicelin inj 1 g
Cefoxitin (ED)	ยาฉีด	Cefoxin inj 1 g
Cefuroxime axetil (ED)	ยากิน	Zinnat susp 250 mg/5 mL (50 mL)
		Zinnat tab 250 mg
		Zinnat tab 500 mg
		Magnaspor tab 250 mg
		Furoxime tab 500 mg
Cefuroxime sodium (non-ED)	ยาฉีด	Furoxime inj 750 mg

Generation / ชื่อทั่วไป (บัญญัติยา)	รายการยาในโรงพยาบาล	
	รูปแบบ	ชื่อการค้า/ความแรง
Third		
Cefdinir (non-ED)	ยากิน	Samnir cap 100 mg
		Omnicef cap 100 mg
		Samnir susp 125 mg/5 mL (30 mL)
		Omnicef syr 125 mg/5 mL (30 mL)
Cefditoren (non-ED)	ยากิน	Meiact fine granule powder 50 mg
		Meiact tab 100 mg
Cefixime (ED)	ยากิน	Cefspan cap 100 mg
		Cefspan susp 100 mg/5 mL (30 mL)
Cefoperazone + Sulbactam (ED)	ยาฉีด	Bacticept inj 1 g
		Bacticept inj 1.5 g
		Sulperazone inj 1 g
		Sulperazone inj 1.5 g
Cefotaxime (ED)	ยาฉีด	Claraxim inj 1 g
		Claraxim inj 500 mg
Ceftazidime (ED)	ยาฉีด	Zeftam M.H. inj 1 g
Ceftibuten (non-ED)	ยากิน	Cedax oral susp 36 mg/mL (30 mL)

Generation / ชื่อทั่วไป (บัญญัติยา)	รายการยาในโรงพยาบาล	
	รูปแบบ	ชื่อการค้า/ความแรง
Third		
Ceftriaxone (ED)	ยาฉีด	Cef-zone IV inj 1 g
		Rocephin IV inj 1 g
		Cef-3 IV inj 500 mg
		Ceftrex IM inj 1 g
		Cef-3 IM inj 500 mg
Fourth		
Cefepime (non-ED)	ยาฉีด	Sefpime IV inj 1 g
		Maxipime IV/IM inj 1 g

Creon® 10000

Creon® 10000 เป็นแคปซูลเจลาตินชนิดแข็ง มี pancreatin 150 มิลลิกรัม ซึ่งบรรจุอยู่ในแกรนูลชนิดทนกรด มีฤทธิ์ของเอนไซม์ เท่ากับ amylase 8,000 หน่วย lipase 10,000 หน่วย protease 600 หน่วย

ข้อบ่งใช้ : รักษาภาวะการขาดน้ำย่อยจาก

ตับอ่อน ทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก

ปกติควรกลืนทั้งแคปซูลพร้อมกับน้ำ **ไม่บดหรือเคี้ยวแคปซูล** ในผู้ที่กลืนแคปซูลได้ลำบาก สามารถแกะแคปซูลออกแล้วโปรยเม็ดกลมเล็กๆ ที่อยู่ในแคปซูลลงในอาหารอ่อนที่ไม่ต้องเคี้ยว (ที่มี pH < 5.0) หรือโปรยในเครื่องดื่มที่มี pH < 5.0 เช่น น้ำผลไม้

ระวังการใช้ Terbutaline ใน Preterm labor

Terbutaline sulfate inj. ที่มีในศิริราช มีความเข้มข้น 0.5 mg/mL (1 หลอดมี 1 mL) ขึ้นทะเบียน สำหรับฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (SC) เท่านั้น

มีคำเตือนจาก USFDA เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้ Terbutaline ในรูปแบบ IV ใน preterm labor (ระยะเวลาการใช้นาน 2-3 วัน) โดยพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับสตรีที่ตั้งครรภ์ กล่าวคือ ทำให้เกิดระดับน้ำตาลในเลือดสูง ระดับไปแตสเซียมในเลือดต่ำ หัวใจเต้นผิดปกติ หว่น้ำท่วมปอด กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ทั้งนี้มีข้อมูลอีกด้วยว่ายาในรูปแบบรับประทานก็มีความเสี่ยงในการเกิดอาการไม่พึงประสงค์มากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับเช่นกัน

Terbutaline มี off-labeled indications ในเรื่อง preterm labor มาเป็นเวลานาน แต่เนื่องจากมีรายงานพบอาการไม่พึงประสงค์มากขึ้น ทำให้ USFDA ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในเอกสารกำกับยา และเพิ่มคำเตือนลงในเอกสารกำกับยาด้วย

เอกสารอ้างอิง

Terbutaline: Label Change - Warnings Against Use for Treatment of Preterm Labor [Homepage on internet]: USFDA; [Accessed on Feb 20, 2011]. Available from <http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm243843.htm>

ควรระวังอาการของทารกหลังคลอด ในสตรีตั้งครรภ์ที่กินยาจิตเวช

USFDA แจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในฉลากยา antipsychotics ในส่วนที่เกี่ยวกับสตรีตั้งครรภ์ โดยให้มีการระบุคำเตือนเกี่ยวกับอาการ EPS และ withdrawal ในทารกที่เกิดจากแม่ที่กินยานี้ในไตรมาสที่สามของการตั้งครรภ์ อาการที่อาจเกิดกับทารกได้ก็คือ กระวนกระวาย มีความผิดปกติของ muscle tone สั่นง่วงซึมอย่างมาก หายใจลำบาก ไม่ดูดนม อาการเหล่านี้ อาจจะเป็นอยู่เป็นชั่วโมงหรือเป็นวันหลังคลอด แต่ไม่จำเป็นจะต้องมีการรักษาอย่างจำเพาะเป็นพิเศษแต่อย่างใด

สูติแพทย์จำเป็นต้องซักถามสตรีตั้งครรภ์ด้วย เพื่อจะได้เตรียมการเฝ้าระวังอาการของทารกหลังคลอด และส่งต่อข้อมูลให้กุมารแพทย์ด้วย

เอกสารอ้างอิง

Antipsychotic drugs: Class Labeling Change - Treatment During Pregnancy and Potential Risk to Newborns [Homepage on internet]: USFDA; [Accessed on Feb 24, 2011]. Available from <http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm244175.htm>



มีอะไรในฉบับนี้

- ◆ Cephalosporins ที่มีในศิริราช
- ◆ Creon® 10000
- ◆ ระวัง ! การใช้ Terbutaline ใน Preterm labor
- ◆ ควรระวังอาการของทารกหลังคลอด ในสตรีตั้งครรภ์ที่กินยาจิตเวช

ปีที่ 10 ฉบับที่ 4

เดือนกุมภาพันธ์ 2554

