

ชื่อการค้ายาเก่าที่ควรรู้

ชื่อการค้าเหล่านี้เป็นชื่อยาที่อาจพบได้ในใบสั่งยา ซึ่งในปัจจุบันเป็นยาที่ไม่มีในโรงพยาบาล แต่มียาในชื่อการค้าอื่นๆ ที่เป็นยาตัวเดียวกัน ดังนี้

ชื่อการค้าที่ไม่มีใน รพ.	ชื่อสามัญทางยา	ชื่อการค้าที่มีใน รพ.
ACA [®] , Artane [®]	Trihexyphenidyl	Benzhexol [®] 2, 5 mg (Tab.)
Anafranil [®]	Clomipramine	Inaryl [®] 10,25 mg (Tab.)
Catapress [®]	Clonidine	Hypodine [®] 0.5 mg (Tab.)
Largactil [®]	Chlorpromazine	Matcine [®] 25,50,100 mg (Tab.)
Melleril [®]	Thioridazine	Tidazine [®] 10,25,50,100mg (Tab.)
Methergin [®]	Methylethergometrine maleate	Expogin [®] 0.2 mg/mL (Inj.)
Narcan [®]	Naloxone	Naloxone DBL [®] 400 mcg/mL (Inj.)

ชื่อการค้าที่ไม่มีใน รพ.	ชื่อสามัญทางยา	ชื่อการค้าที่มีใน รพ.
Thiomed [®]	Thioridazine	Tidazine [®] 10,25, 50,100 mg(Tab.)
Modecate [®]	Fluphenazine	Fendec [®] 25,50 mg (Inj.)
Periactin [®]	Cyproheptadine	Cyheptine [®] 4 mg (Tab.)
Piriton [®]	Chlorpheniramine	Chlorpheniramine (Tab. , Inj.)
Renitec [®]	Enalapril	Anapril [®] 5 ,20 mg Nalopril [®] 10 mg
Stilnox [®]	Zolpidem	Dactive 10 [®] 10 mg (Tab.)

ความคงตัวของ H-mide

หลังเปิดใช้

Furosemide injection ขนาด 250 mg/25 mL
รูปแบบสารละลายปราศจากเชื้อ บรรจุใน vial ที่มีใน
โรงพยาบาลขณะนี้ เป็นของบริษัทแมคโครฟาร์ จำกัด
ชื่อการค้า H-mide[®] ความคงตัวหลังเปิดใช้แล้ว สามารถ
เก็บที่อุณหภูมิ 15-30 องศาเซลเซียส เก็บได้นาน 72
ชั่วโมง



มีอะไรในฉบับนี้

- ◆ Clexane ห้ามเก็บในตู้เย็น
- ◆ Drug interaction ระหว่างยา Senokot[®] กับ Digoxin
- ◆ ชื่อการค้ายาเก่าที่ควรรู้
- ◆ ความคงตัวของ H-mide[®] หลังเปิดใช้

ปีที่ 11 ฉบับที่ 11

เดือนกันยายน 2555

Clexane® ห้ามเก็บในตู้เย็น



เนื่องจากมีบุคลากรทางการแพทย์โทรศัพท์เข้ามาสอบถามเรื่องสามารถเก็บ Clexane® ไว้ในตู้เย็นได้หรือไม่ ดังนั้นศิริราชเภสัชสารบัญชานี้ขอเสนอข้อมูลความคงตัวที่ได้จากบริษัท

Clexane® (enoxaparin sodium) จัดเป็นยาในกลุ่มเฮพารินที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ (low molecular weight heparin) รูปแบบพร้อมฉีด (prefilled syringe) ในโรงพยาบาลศิริราชมี 3 ความแรง คือ 40 mg/0.4 mL, 60 mg/0.6 mL และ 80 mg/0.8 mL

วิธีการบริหารยา

ยานี้ห้ามฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

ปกติแนะนำให้บริหารยาโดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง

ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้ที่ต้องให้ยาโดยการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ได้แก่ กรณีใช้ในการฟอกโลหิตด้วย

เครื่องไตเทียมที่จะใช้ยาฉีดขนาด 20 mg และ 40 mg และกรณีการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ชนิด ST – segment elevation

การบริหารยาโดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (subcutaneous; SC) ควรฉีดยาโดยให้ผู้ป่วยเตรียมพร้อมในท่านอน และฉีดเข้าใต้ผิวหนังบริเวณไขมันชั้นหน้าท้องด้านข้างของลำตัวก่อนไปข้างหน้า ควรห่างจากสะดืออย่างน้อย 5 เซนติเมตร โดยฉีดสลับข้างระหว่างด้านซ้ายและขวา เมื่อใช้ในขนาด 20 mg และ 40 mg ห้ามได้ฟองอากาศออกจากหลอดบรรจุยาก่อนทำการฉีดเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียยา แต่ถ้าใช้ขนาด 60 และ 80 mg สามารถได้ฟองอากาศได้

การเก็บรักษา

แนะนำเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส ห้ามแช่แข็ง สำหรับหอผู้ป่วยที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศทางบริษัทมีข้อมูลการศึกษาความคงตัวที่อุณหภูมิต่างๆ ดังนี้

- ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ยามีความคงตัว 18 เดือน
- ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ยามีความคงตัว 12 เดือน
- ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ยามีความคงตัว 3 เดือน

บริษัทไม่มีข้อมูลการศึกษาความคงตัวของยากรณีเก็บไว้ในตู้เย็น ดังนั้นห้ามเก็บไว้ในตู้เย็นในกรณีที่นำไปเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วไม่แนะนำให้ใช้ต่อ ควรทิ้งไป

Drug interaction ระหว่างยา Senokot® กับ Digoxin



Senokot® เป็นยาระบายที่ได้จากผักเมล็ดของมะขามแขก (senna) โดยมีตัวยาลำคัญ คือ sennosides

อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้ คือ อาการไม่สบายท้อง อาการท้องเสียซึ่งอาจเกิดร่วมกับการสูญเสีย น้ำและ electrolyte ในกรณีที่ได้รับประทานในขนาดสูง

ยานี้จัดอยู่ใน Pregnancy category C แต่สามารถใช้ได้ในหญิงให้นมบุตร

การใช้ยา Senokot® ปริมาณมากกว่าปกติ หรือใช้เป็นระยะเวลานาน ร่วมกับยา digoxin อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดพิษจาก digoxin ได้ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยกลไก senna ทำให้เกิดภาวะ hypokalemia ซึ่งมีระยะเวลาที่เริ่มแสดงอาการชัก และความรุนแรงในการเกิดปฏิกิริยาอยู่ในระดับปานกลาง (moderate) ดังนั้นการใช้ร่วมกันควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์