

ชื่อเรื่อง Flow Ectopic pregnancy (Surgical treatment)

บทนำ (ที่มาความสำคัญของเรื่อง/วัตถุประสงค์) ครรภ์นอกมดลูกเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ป่วยเนื่องจากมีการเสียเลือดในช่องท้องเพราะมีการฉีกขาดของบริเวณที่มีพยาธิสภาพ การให้บริการสุขภาพสำหรับผู้ป่วยตั้งครรภ์นอกมดลูกจึงเป็นการให้บริการทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย ความรวดเร็วในการบริการจึงมีความสำคัญ สมาชิกใน CoP ectopic pregnancy จึงให้ความสำคัญต่อการไหลของบริการสำหรับผู้ป่วยครรภ์นอกมดลูกที่ได้รับการผ่าตัด

เนื้อหา (รายละเอียด/กระบวนการ/ประสบการณ์) จากการรวบรวมกระบวนการบริการผู้ป่วยครรภ์นอกมดลูกที่ได้รับการผ่าตัดพบว่าการบริการผู้ป่วยครรภ์นอกมดลูกสามารถแยกตามช่วงเวลาการให้บริการเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่การบริการในเวลาราชการ และการบริการนอกเวลาราชการ

ผู้ป่วยครรภ์นอกมดลูกซึ่งมารับบริการในเวลาราชการเป็นผู้ป่วยจาก OPD นรีเวช OPD ANC และ หน่วยตรวจอื่นๆ ซึ่งให้บริการผู้ป่วยนอก ได้แก่ หน่วยมีบุตรยาก ห้องตรวจอัลตราซาวด์ และห้องแพทย์เวร

ผู้ป่วยครรภ์นอกมดลูกซึ่งมารับบริการนอกเวลาราชการเป็นผู้ป่วยจากห้องแพทย์เวร คลินิกนอกเวลา และห้องคลอดติดเชื่อ

หลังจากผู้ป่วยเข้ารับบริการที่หน่วยตรวจในเวลาและนอกเวลาราชการจำแนกผู้ป่วยโดยใช้อาการคงที่ของระบบไหลเวียนโลหิตจำแนกได้ 2 กลุ่ม คือ ผู้ป่วยครรภ์นอกมดลูกฉุกเฉิน และผู้ป่วยครรภ์นอกมดลูกไม่ฉุกเฉิน

ผู้ป่วยครรภ์นอกมดลูกฉุกเฉิน ได้แก่ ผู้ป่วยครรภ์นอกมดลูกที่มีอาการช็อก ชัก หหมดสติ ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะรับไว้เป็นผู้ป่วยในเพื่อการผ่าตัดฉุกเฉิน โดยการส่งตัวผู้ป่วยจากหน่วยตรวจไปยังห้องผ่าตัดทันที ภายหลังการผ่าตัดผู้ป่วยจะได้รับการดูแลรักษาในห้องผู้ป่วยใน โดยได้รับการดูแลตาม Modified early warning sign post-operative care. และการดูแลตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางนรีเวช

ผู้ป่วยครรภ์นอกมดลูกไม่ฉุกเฉิน ได้แก่ผู้ป่วยครรภ์นอกมดลูกที่มีอาการคงที่ของระบบไหลเวียนโลหิต ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะรับไว้เป็นผู้ป่วยในตามกระบวนการปกติของการรับผู้ป่วยที่ไม่ได้นัดหมายมาอนโรงพยาบาลเพื่อเฝ้าระวังอาการตกเลือดในช่องท้อง ถ้าพบอาการแสดงของการตกเลือดในช่องท้องหรือมีแผนการรักษาโดยการผ่าตัดส่องกล้อง ผู้ป่วยจะได้รับการผ่าตัด ภายหลังการผ่าตัดผู้ป่วยจะได้รับการดูแลรักษาในห้องผู้ป่วยใน โดยได้รับการดูแลตาม Modified early warning sign post-operative care. และการดูแลตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางนรีเวช

การนำไปใช้ (เคยใช้ที่ไหน ผลเป็นอย่างไร) กระบวนการดูแลผู้ป่วยครรภ์นอกมดลูกตาม Flow Ectopic pregnancy (Surgical treatment) เป็นแนวทางที่มีการปฏิบัติใน OPD นรีเวช OPD ANC หน่วยแพทย์เวร และห้องคลอดติดเชื่อ เป็นต้น

จากการปฏิบัติงานพบว่าผู้ป่วยครรภ์นอกมดลูกฉุกเฉิน ได้รับการส่งตัวจากหน่วยตรวจ OPD นรีเวช หน่วยแพทย์เวร และห้องคลอดติดเชื่อ ไปยังห้องผ่าตัดทันทีตาม flow

ผลลัพธ์ (ข้อดี/ใช้วิธีดังกล่าวแล้วผลเป็นอย่างไร) กระบวนการดูแลผู้ป่วยครรภ์นอกมดลูกตาม Flow Ectopic pregnancy (Surgical treatment) ทำให้ผู้ป่วยครรภ์นอกมดลูกฉุกเฉินที่มีการตกเลือดในช่องท้องและมีภาวะช็อก ได้รับการผ่าตัดแก้ไขปัญหาด่วนเร็ว ลดอันตรายจากการเสียเลือดในช่องท้องจำนวนมาก

ข้อควรระวัง (การดำเนินการดังกล่าวมีข้อควรระวังอย่างไร) ในผู้ป่วยครรภ์นอกมดลูกที่สงสัยมีการเสียเลือดในช่องท้องและมีอาการคงที่ของระบบไหลเวียนโลหิตซึ่งจะรับเป็นผู้ป่วยในควรมีการเตรียมความพร้อมของผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการผ่าตัดเช่นเดียวกับผู้ป่วยที่มีความไม่คงที่ของระบบไหลเวียนโลหิต

สรุป (ใจความสำคัญ/key word) ครรภ์นอกมดลูก กระบวนการดูแล

ผู้บันทึก.....ดร. มาลี งามประเสริฐ.....

ผู้ตรวจสอบ.....นางวรรณ หิมะสุข.....ที่ปรึกษา

.....นางสาววัลลีย์ ศรีตงกิม.....หัวหน้าหอผู้ป่วย 100 สมเด็จพระศรีนครินทร์ 11/1.....

วันที่.....21 มิถุนายน 2563.....

กลุ่ม CoP Ectopic Pregnancy

Flow Ectopic Pregnancy (Surgical Treatment)

