

Top Hit ทามบอย: ยาฉีด Glycophos®

Glycophos® เป็นสารละลายเข้มข้น

ที่มีส่วนประกอบสำคัญ คือ sodium

glycerophosphate pentahydrate

306.1 mg/mL ในสารละลาย 1 mL

ประกอบด้วย phosphate 1 mmol และ

sodium 2 mmol สารละลายมีค่า pH 7.4

และมีค่า osmolality = 2,760 mOsm/kg H₂O

ข้อบ่งใช้: เป็นสารอาหารเสริมที่ให้ทางหลอดเลือดดำในผู้ใหญ่และเด็กทารก เพื่อให้มีปริมาณฟอสเฟตเพียงพอต่อความต้องการ

การบริหารยา Glycophos®:

เจือจาง Glycophos® 1 หลอด (20 mL) ด้วย D5W หรือ NSS อย่างน้อย 70 mL (หรือเจือจางจนมีปริมาตรครบ 100 mL) แล้วหยดเข้าทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย (peripheral vein) นานประมาณ 8 ชั่วโมงขึ้นไป (กรณีจำเป็นอาจใช้เวลาหยด 4-6 ชั่วโมง)

ในกรณีการบริหารยาทางหลอดเลือดดำส่วนกลาง (central vein) อาจเจือจางจนมีปริมาตรครบ 50 mL แล้วจึงหยดเข้าทางหลอดเลือดดำด้วยระยะเวลาเช่นเดียวกัน

ห้ามบริหาร Glycophos® แบบไม่เจือจางโดยเด็ดขาด

เงื่อนไขการเบิกจ่ายา Glycophos® ในรพ.ศิริราช:

เบิกจ่ายได้ในกรณีระบุข้อบ่งใช้ “ใช้ในเด็กแรกเกิด (อายุน้อยกว่า 28 วัน) ที่ต้องการให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ (total parenteral nutrition)” ลงในใบสั่งยา และส่งใช้ในรพ.ศิริราชเท่านั้น

เอกสารอ้างอิง

Product information: Glycophos®, Sodium glycerophosphate,

Fresenius Kabi, Bangkok, Thailand.



PediaSure® 1+ Complete: ข้อการคำใหม่และสูตรใหม่

อ้างอิงหนังสือจากฝ่ายเภสัชกรรม

เลขที่ อว 78.072/เอก1198/2563 เรื่อง แจ้ง

จำหน่ายรายการผลิตภัณฑ์ PediaSure® 1+

Complete Powder 400 g ซึ่งเป็นอาหาร

สูตรครบถ้วนสำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป

ที่รับประทานอาหารน้อยและมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์

ราคากระป๋องละ 260 บาท และเบิกไม่ได้ทุกสิทธิการรักษา

ตามที่บริษัท แอ็บบอต ลาบอแรตอรีส์ จำกัด แจ้ง

เปลี่ยนแปลงสูตร PediaSure® Complete Powder 400 g

และเปลี่ยนชื่อการค้าเป็น PediaSure® 1+ Complete

Powder 400 g ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในสูตรตำรับ มีดังนี้

PediaSure® Complete (ชื่อการค้าเดิมและสูตรเดิม)	PediaSure® 1+ Complete (ชื่อการค้าใหม่และสูตรใหม่)
คาร์โบไฮเดรต	
ประกอบด้วยน้ำตาลซูโครส และคอร์นไซรัป	ประกอบด้วยน้ำตาลซูโครส (ลดน้ำตาลซูโครสลง 25%) และแป้งข้าวโพดที่ผ่านการย่อย (maltodextrin)
โปรตีน	
มี 2 ชนิด คือ เวย์ และเคซีน	มี 3 ชนิด คือ เวย์ เคซีน และโปรตีนถั่วเหลือง
ใยอาหาร	
Fructo-oligosaccharide	Fructo-oligosaccharide (เพิ่มจากสูตรเดิม 25%)
การใช้ใน lactose intolerance	
ใช้ได้ (lactose <0.5 g/serving)	ใช้ได้ (lactose <1g/serving)



ยาใหม่: ยาเม็ด Genvoya®

Genvoya® เป็นยาต้านเอชไอวี

(antiretroviral agents) สูตรผสม ซึ่ง

ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ 4 ชนิด

ในแต่ละเม็ด ดังนี้

- elvitegravir 150 mg เป็นยา

ในกลุ่ม integrase inhibitors

- cobicistat 150 mg เป็นยาที่มี

คุณสมบัติเป็น booster ส่งผลเพิ่มระดับยา elvitegravir

- emtricitabine 200 mg เป็นยาในกลุ่ม nucleoside

reverse transcriptase inhibitors

- tenofovir alafenamide 10 mg เป็นยาในกลุ่ม

nucleotide reverse transcriptase inhibitors

ขนาดยาที่แนะนำตามเอกสารกำกับยา:

ผู้ป่วยอายุ 12 ปีขึ้นไป และมีน้ำหนักอย่างน้อย 35 kg

รับประทานครั้งละ 1 เม็ด พร้อมอาหาร ทุก 24 ชั่วโมง

คำแนะนำที่สำคัญ:

- ห้ามรับประทานยานี้พร้อมยาลดกรดกลุ่ม antacids

หรือ polyvalent cations (ต้องรับประทานห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง) เนื่องจากทำให้การดูดซึมยาลดลง และอาจส่งผลให้เกิดเชื้อดื้อยาได้

- กรณีลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ พร้อมอาหาร แต่กรณีที่เคยลืมรับประทานยาปกติมากกว่า 18 ชั่วโมง ให้รอจนถึงเวลารับประทานยาปกติครั้งถัดไป และให้รับประทานตามขนาดปกติที่เคยรับประทาน โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

เอกสารอ้างอิง

Genvoya® [Package Insert]. Thailand: DCH Auriga: 2018.



การบริหารยาเม็ด SPRYCEL® (dasatinib) ทาง NG tube

Sprycel® (dasatinib) เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์ม ในรพ. ศิริราชมีความแรง 20 mg, 50 mg และ 70 mg เป็นยาที่ใช้รักษาผู้ป่วย chronic myeloid leukemia (CML) และผู้ป่วย acute lymphoblastic leukemia (ALL) บางราย

บริษัทผู้ผลิต (Bristol-Myers Squibb) ได้แจ้งขั้นตอนการเตรียมยา Sprycel® เพื่อนำไปบริหารทาง NG tube ดังต่อไปนี้

1. เตรียมน้ำส้มหรือน้ำแอปเปิ้ล 100% (ปราศจากสารกันเสีย) ที่แช่เย็น ปริมาณ 30 mL ในภาชนะเตรียมยา
2. นำเม็ดยาใส่ลงไปในน้ำส้มหรือน้ำแอปเปิ้ล ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที แล้วหมุนวน (swirl) ประมาณ 3 วินาที ระวังไม่ให้สารละลายหกออกมา
3. หลังจากนั้น 10 นาทีให้หมุนวน (swirl) อีกครั้ง
4. หลังจากนั้น 5 นาที (รวมเวลาทั้งสิ้น 20 นาทีหลังจากใส่เม็ดยา) ให้หมุนวน (swirl) อีกครั้ง เป็นครั้งสุดท้าย
5. บริหารยาทาง NG tube
6. ล้างภาชนะที่ใช้ด้วยน้ำส้มหรือน้ำแอปเปิ้ล 15 mL เพื่อละลายยาที่อาจตกค้างข้างภาชนะ แล้วนำไปบริหารยาทาง NG tube จนหมด

เอกสารอ้างอิง

Product information: SPRYCEL®, dasatinib, Bristol-Myers Squibb, Bangkok, Thailand.

วิธีใช้ยาสอดช่องคลอด: Neo-Penotran® Forte



Neo-Penotran® Forte เป็นยาสอดช่องคลอดสำหรับรักษาการติดเชื้อรา *Candida albicans* การติดเชื้อแบคทีเรีย anaerobe และ *Gardnerella vaginalis* และการติดเชื้อ *Trichomonas vaginalis* ที่ช่องคลอด

แต่ละเม็ดมีตัวยาสำคัญคือ metronidazole 750 mg และ miconazole nitrate 200 mg โดยมีวิธีใช้ยา ดังนี้

1. ถ้าเม็ดยามี (เนื่องจากมีส่วนประกอบเป็น wax) ให้นำไปแช่ตู้เย็นในช่องธรรมดา (ห้ามแช่แข็ง) ก่อนสอด
2. นอนหงาย ชันเข่าขึ้น แยกขาออก
3. สอดเม็ดยาเข้าไปในช่องคลอดให้ลึกจนสุดนิ้ว
4. นอนพัก 10-15 นาที เพื่อรอละลาย

คำแนะนำอื่นๆ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา:

ควรสอดยาดูติดต่อกันจนครบ 7 วัน ควรงดใช้ยาขณะมีประจำเดือน และควรงดมีเพศสัมพันธ์ขณะรักษา

ยานี้อาจทำให้เกิดอาการแสบระคายเคืองได้บ้างในช่วง 2-3 วันแรกของการรักษา

การเก็บรักษา: เก็บยาที่อุณหภูมิไม่เกิน 30°C

เอกสารอ้างอิง

Product information: Neo-Penotran® Forte, metronidazole and miconazole nitrate, Exeltis, Bangkok, Thailand.



มีอะไรในฉบับนี้

- ❖ Top Hit ถามบ่อย: ยาฉีด Glycophos®
- ❖ PediaSure® 1+ Complete: ชื่อการค้าใหม่และสูตรใหม่
- ❖ ยาใหม่: ยาเม็ด Genvoya®
- ❖ การบริหารยาเม็ด SPRYCEL® (dasatinib) ทาง NG tube
- ❖ วิธีใช้ยาสอดช่องคลอด: Neo-Penotran® Forte

ปีที่ 19 ฉบับที่ 11

เดือนสิงหาคม 2563

สอบถามข้อมูลยาและพิษวิทยา โทร 9 - 7007

สอบถาม Medication Reconciliation (MR) โทร 9 - 6964

สอบถามเรื่องแพ้ยา และประวัติการแพ้ยา โทร 9 - 9555