

หลีกเลี่ยงการใช้ยาในกลุ่ม NSAIDs ในสตรีตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ขึ้นไป

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สหรัฐอเมริกา (USFDA) แจ้งเตือนให้หลีกเลี่ยงการใช้ยาในกลุ่ม nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) ในสตรีตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ขึ้นไป เนื่องจากมีรายงานว่ายาในกลุ่ม NSAIDs ส่งผลให้การทำงานของไตของทารกในครรภ์แย่ลง และทำให้น้ำคร่ำมีปริมาณลดลง ทั้งนี้ น้ำคร่ำจะช่วยลดแรงกดดันต่อพัฒนาการของปอด ระบบทางเดินอาหาร และกล้ามเนื้อของทารกในครรภ์

นอกจากนี้ USFDA แจ้งว่า การใช้ยาในกลุ่ม NSAIDs ในสตรีตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 30 สัปดาห์ อาจทำให้เกิดความผิดปกติต่อหัวใจของทารกในครรภ์

คำแนะนำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

หลีกเลี่ยงการใช้ยาในกลุ่ม NSAIDs ในสตรีตั้งครรภ์อายุครรภ์ 30 สัปดาห์ขึ้นไป และหากจำเป็นต้องใช้ยาในกลุ่ม NSAIDs ในสตรีตั้งครรภ์อายุครรภ์ 20-30 สัปดาห์ (ยกเว้นการให้ยา aspirin 81 mg) ควรใช้ในขนาดยาต่ำที่สุด ในระยะเวลาสั้นที่สุด หากต้องใช้ติดต่อกันเกิน 48 ชั่วโมง ควรทำ ultrasound เพื่อตรวจดูปริมาณน้ำคร่ำร่วมด้วย

เอกสารอ้างอิง

USFDA. FDA recommends avoiding use of NSAIDs in pregnancy at 20 weeks or later because they can result in low amniotic fluid. [cited October, 15 2020]. Available from <https://www.fda.gov/media/142967/download>

ACARIZAX®: ยาจากสารสกัดไรฝุ่นบ้าน

ACARIZAX® เป็นยาชนิดเม็ดสำหรับอมใต้ลิ้น ใช้รักษาโรคเยื่อจมูกอักเสบในผู้ป่วยอายุ 12-65 ปี และโรคหอบหืดในผู้ป่วยอายุ 18-65 ปีที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าเกิดจากการแพ้ไรฝุ่นบ้านบางชนิด ยานี้ประกอบด้วยสารสกัดไรฝุ่นบ้าน 2 สายพันธุ์ ได้แก่ *Dermatophagoides pteronyssinus* และ

Dermatophagoides farina

ข้อห้ามใช้:

- ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้ เช่น เจลาตินจากปลา mannitol และ sodium hydroxide
- ห้ามใช้ในผู้ที่เคยเป็นโรคหอบหืดรุนแรงใน 3 เดือน ก่อน
- ห้ามใช้ในผู้ที่กำลังรับประทานยากดภูมิคุ้มกันหรือยารักษามะเร็ง
- ห้ามใช้ในผู้ที่เพิ่งถอนฟัน ผ่าตัดในช่องปาก มีแผลในช่องปาก หรือมีการติดเชื้อในช่องปาก

ขนาดยาและคำแนะนำที่สำคัญตามเอกสารกำกับยา:

- อมใต้ลิ้นครั้งละ 1 เม็ดต่อวัน ทั้งนี้ห้ามกลืนน้ำลายอย่างน้อย 1 นาที
- ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่มหลังจากรับประทานยาอย่างน้อย 5 นาที
- ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 8-14 สัปดาห์ จึงจะเริ่ม

เห็นผลในการรักษา

เอกสารอ้างอิง

ACARIZAX® [Package Insert]. United Kingdom: Catalent UK Swindon Zydis: 2018



Clotting factor products ที่มีในรพ.ศิริราช

เนื่องจากปัจจุบันรพ.ศิริราชมี clotting factor products หลายรายการ จึงขอแสดงรายการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ชื่อยา	ชื่อการค้า (ความแรง)
Factor VIIa (recombinant)	NovoSeven® (1 mg)
Factor VIII (recombinant) หรือ Antihemophilic factor	Recombinate® (250, 500 iu) Advate® (250, 500 iu) NovoEight® (250, 500 iu)
Factor VIII / von Willebrand factor complex (human) หรือ Antihemophilic factor / von Willebrand factor complex	Alphanate® (250 iu/5 mL, 500 iu/5 mL)
Factor VIII inhibitor bypassing agent (human) หรือ Anti-inhibitor coagulant complex หรือ Activated prothrombin complex concentrate (aPCC)	FEIBA® (500 iu)
Factor IX (human)	AlphaNine® SD (500 iu) Immunine® (600 iu)
Factor IX complex (human) หรือ Prothrombin complex concentrate (PCC)	Profilnine® SD (500 iu/5 mL)

Permethrin lotion 1% กำจัดเหา และ 5% กำจัดหิด

Permethrin lotion 1% w/w (โลชั่นกำจัดเหา)	Permethrin lotion 5% w/v (โลชั่นกำจัดหิด)
	
ชื่อการค้า (ขนาดบรรจุ)	
A SCALP® (60 mL)	A SCABS® (30 mL)
วิธีใช้ยา (เขย่าขวดก่อนใช้ยา)*	
- สระผมตามปกติด้วยแชมพูที่ไม่มีส่วนผสมของครีมยาสีผมออกให้สะอาด และเช็ดให้แห้ง - ขลิบผมตามเส้นผมและหนังศีรษะให้ทั่วถึง โดยเฉพาะหลังใบหูและต้นคอ ทิ้งไว้ 10 นาที แล้วล้างออก (ไม่ใช่ครีมยาสีผม) เช็ดผมให้แห้งแล้วหวีผมด้วยหวีซี่ถี่หรือหวีเส้นใยเพื่อกำจัดไข่เหาหรือเหา - อาจใช้ซ้ำหลังจากใช้ยาครั้งแรกไปแล้ว 7 วัน เพื่อให้เกิดผลการรักษาสูงสุด	- ทาและนวดโลชั่นตั้งแต่คอถึงฝ่าเท้า โดยเน้นบริเวณง่ามนิ้วมือและนิ้วเท้า ซอกเล็บมือและเล็บเท้า ข้อมือ รักแร้ บริเวณอวัยวะเพศ และก้น - ห้ามทาบริเวณใบหน้าและศีรษะ - ทิ้งไว้ 12-14 ชั่วโมง จึงอาบน้ำล้างยาออก - หากตรวจพบตัวหิดที่มีชีวิต/รอยโรคใหม่ ใช้ยานี้ซ้ำอีกครั้ง โดยเว้นห่างจากครั้งแรก 7-14 วัน

* ห้ามใช้ permethrin lotion ในเด็กอายุ < 2 เดือน

เอกสารอ้างอิง

1. A SCALP® [package insert]. Malaysia: Hoe Pharmaceutical Sdn Bhd; 2014.
2. A SCABS® [package insert]. Malaysia: Hoe Pharmaceutical Sdn Bhd; 2014.

New Arrival: SI-CARB Drink

ชื่อผลิตภัณฑ์: SI-CARB Drink

ข้อบ่งใช้: ผงคาร์โบไฮเดรต

(ปราศจากไขมัน) สำหรับขงดื่ม

เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยในโครงการฟื้นตัวเร็วหลังการผ่าตัด

(Siriraj Enhanced Recovery

after Surgery; SiERAS)

ขนาดและวิธีใช้: 1 ซองละลายน้ำสะอาด 400 mL เขย่าจนผงละลายหมด ต่อมตามแพทย์สั่ง

**** ยาที่ผสมแล้วควรใช้ก่อน 24 ชั่วโมง ****

ส่วนประกอบสำคัญและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์:

(เมื่อละลายตามวิธีที่กำหนดจนได้ปริมาตร 400 mL)

ให้พลังงาน 200 kcal มัลติวิตามิน 40 g กลูโคส 10 g

โปตัสเซียม 488 mg แมกนีเซียม 4 mg แคลเซียม 24 mg

ฟอสฟอรัส 4 mg โซเดียม 200 mg และคลอไรด์ 54.1 mg

Osmolality 280 mOsm/kg H₂O ความเป็นกรด-ด่าง

(pH) 7 ผลิตภัณฑ์แต่งสี sunset yellow แต่งกลิ่นส้ม

ขนาดบรรจุ: 50 g/ซอง

ราคาขาย: 80 บาท/ซอง (เบิกไม่ได้ทุกสิทธิ)

ที่มา: งานผลิตยาทั่วไป โรงพยาบาลศิริราช 2563



มีอะไรในฉบับนี้

- ❖ หลีกเลี่ยงการใช้ยากกลุ่ม NSAIDs ในสตรีตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ขึ้นไป
- ❖ ACARIZAX®: ยาจากสารสกัดไรฝุ่นบ้าน
- ❖ Clotting factor products ที่มีในรพ.ศิริราช
- ❖ Permethrin lotion 1% กำจัดเหา และ 5% กำจัดหิด
- ❖ New Arrival: SI-CARB Drink

สอบถามข้อมูลยาและพิษวิทยา โทร 9 - 7007

สอบถาม Medication Reconciliation (MR) โทร 9 - 6964

สอบถามเรื่องแพ้ยา และประวัติการแพ้ยา โทร 9 - 9555

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2

เดือนพฤศจิกายน 2563