

GLP-1 receptor agonists products in SIRIRAJ

ชนิดยา	GLP-1 receptor agonists				GLP-1 receptor agonists / Basal insulin (fixed-dose combinations)	
ชื่อการค้า	VICTOZA® 	SAXENDA® 	TRULICITY® 	OZEMPIC® 	*SOLIQUA® 	*XULTOPHY® 
	Liraglutide	Liraglutide	Dulaglutide	Semaglutide	Lixisenatide (Lixi) / Insulin glargine U100 (iGlar)	
ปริมาณยา	18 mg/3 mL	18 mg/3 mL	0.75 mg/0.5 mL 1.5 mg/0.5 mL	0.25 mg (2 mg/1.5 mL) 0.5 mg (2 mg/1.5 mL) 1 mg (4 mg/3 mL)	Lixi 50 mcg/mL / iGlar 100 U/mL (1 dose step = 0.5 mcg Lixi + 1 unit iGlar)	Lixi 33 mcg/mL / iGlar 100 U/mL (1 dose step = 0.33 mcg Lixi + 1 unit iGlar)
ขนาดในการรักษา	1.2-1.8 mg/day	1.2-3 mg/day	0.75-1.5 mg/week	0.25-1 mg/week	ปรับขนาดยาตามแพทย์สั่ง แนะนำขนาด 10-40 dose step/day	ปรับขนาดยาตามแพทย์สั่ง แนะนำขนาด 30-60 dose step/day
ค่าครึ่งชีวิต	13 ชั่วโมง	13 ชั่วโมง	5 วัน	7 วัน	Lixi 3 ชั่วโมง / iGlar 17-21 ชั่วโมง	
ความถี่ในการบริหารยา	วันละ 1 ครั้ง เวลาเดียวกันทุกวัน	วันละ 1 ครั้ง เวลาเดียวกันทุกวัน	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง วันเดียวกันของแต่ละสัปดาห์	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง วันเดียวกันของแต่ละสัปดาห์	วันละ 1 ครั้ง แนะนำฉีด 1 ชั่วโมง ก่อนอาหารมื้อเช้าหรือมื้อหลัก	
การเก็บรักษา	ก่อนเปิดใช้: เก็บในตู้เย็น 2-8 องศา ห้ามแช่แข็ง	ก่อนเปิดใช้: เก็บในตู้เย็น 2-8 องศา ห้ามแช่แข็ง	ก่อนเปิดใช้: เก็บในตู้เย็น 2-8 องศา ห้ามแช่แข็งหรือ เก็บที่อุณหภูมิห้อง ได้นาน 14 วัน	ก่อนเปิดใช้: เก็บในตู้เย็น 2-8 องศา ห้ามแช่แข็ง	ก่อนเปิดใช้: เก็บในตู้เย็น 2-8 องศา ห้ามแช่แข็ง	
	หลังเปิดใช้ : เก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศา หรือในตู้เย็น ได้นาน 30 วัน	หลังเปิดใช้ : เก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศา หรือในตู้เย็น ได้นาน 30 วัน	-	หลังเปิดใช้: เก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศา หรือในตู้เย็น ได้นาน 42 วัน	หลังเปิดใช้: เก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศา ได้นาน 14 วัน	
ชนิดหัวเข็มที่แนะนำ	NovoTwist needle หรือ NovoFine needle	NovoTwist needle หรือ NovoFine needle	Single-dose prefilled syringe	NovoFine Plus needle	BD microfine needle	

ข้อควรระวัง/ผลข้างเคียง : GI side effect (Nausea, Vomitting, Diarrhea) , Hypoglycemia*