

INCRETIN-BASED THERAPY (INJECTION) IN SIRIRAJ

ชนิดยา				GIP/GLP-1 receptor agonist	GLP-1 receptor agonists / Basal insulin (fixed-dose combinations)		
ชื่อการค้า	Trulicity	Ozempic	Wegovy	Mounjaro	Soliqua	Xultophy	
							
ชื่อยา	Dulaglutide	Semaglutide	Semaglutide	Tirzepatide	Lixisenatide (Lixi) + Insulin glargine U100 (iGlar)		Liraglutide (Lira) + Insulin degludec (iDeg)
ปริมาณยา	0.75 mg/0.5 mL 1.5 mg/0.5 mL	0.25 mg (2 mg/1.5 mL) 0.5 mg (2 mg/1.5 mL) 1 mg (4 mg/3 mL)	0.25 mg (1 mg/1.5 mL) 0.5 mg (2 mg/1.5 mL) 1 mg (4 mg/3 mL) 1.7 mg (6.8 mg/3 mL) 2.4 mg (9.6 mg/3 mL)	2.5 mg (10 mg/2.4 mL) 5 mg (20 mg/2.4 mL) 7.5 mg (30 mg/2.4 mL) 10 mg (40 mg/2.4 mL) 12.5 mg (50 mg/2.4 mL)* 15 mg (60 mg/2.4 mL)*	Lixi 50 mcg/mL + iGlar 100 U/mL (1 dose step = 0.5 mg Lixi + 1 unit iGlar)	Lixi 33 mcg/mL + iGlar 100 U/mL (1 dose step = 0.33 mg Lixi + 1 unit iGlar)	Lira 3.6 mg/mL + iDeg 100 U/mL (1 dose step = 0.036 mg Lira + 1 unit iDeg)
ข้อบ่งชี้ใน การรักษา	T2DM	T2DM	Obesity	T2DM Obesity	T2DM	T2DM	T2DM
ขนาดในการ รักษา	0.75-1.5 mg/week	0.25-1 mg/week	0.25-2.4 mg/week	2.5-15 mg/week	ปรับขนาดยา ตามแพทย์สั่ง แนะนำขนาด 10-40 dose step/day	ปรับขนาดยา ตามแพทย์สั่ง แนะนำขนาด 30-60 dose step/day	ปรับขนาดยา ตามแพทย์สั่ง แนะนำขนาด 10-50 dose step/day
ค่าครึ่งชีวิต	5 วัน	7 วัน		5 วัน	Lixi 3 ชั่วโมง / iGlar 17-21 ชั่วโมง		Lira 13 ชั่วโมง / iDeg 25 ชั่วโมง
ความถี่ ในการ บริหารยา	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง วันเดียวกัน ของแต่ละสัปดาห์	สัปดาห์ละ 1 ครั้ง วันเดียวกันของแต่ละสัปดาห์		สัปดาห์ละ 1 ครั้ง วันเดียวกันของแต่ละสัปดาห์	วันละ 1 ครั้ง แนะนำฉีด 1 ชั่วโมง ก่อนอาหารมื้อเช้าหรือมื้อหลัก		วันละ 1 ครั้ง เวลาเดียวกันทุกวัน
การเก็บรักษา	ก่อนเปิดใช้: เก็บในตู้เย็น 2-8 °C ห้ามแช่แข็ง หรือ เก็บอุณหภูมิห้อง ได้นาน 14 วัน	ก่อนเปิดใช้: เก็บในตู้เย็น 2-8 °C ห้ามแช่แข็ง		ก่อนเปิดใช้: เก็บในตู้เย็น 2-8 °C ห้ามแช่แข็ง	ก่อนเปิดใช้: เก็บในตู้เย็น 2-8 °C ห้ามแช่แข็ง		ก่อนเปิดใช้: เก็บในตู้เย็น 2-8 °C ห้ามแช่แข็ง
		หลังเปิดใช้: เก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 °C หรือในตู้เย็น ได้นาน 42 วัน		หลังเปิดใช้: เก็บที่อุณหภูมิห้อง ไม่เกิน 30 °C ได้นาน 30 วัน	หลังเปิดใช้: เก็บที่อุณหภูมิห้อง ไม่เกิน 30 °C ได้นาน 14 วัน		หลังเปิดใช้: เก็บที่ อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 °C หรือในตู้เย็น ได้นาน 21 วัน
ชนิดหัวเข็มที่ แนะนำ	Single-dose prefilled syringe	NovoFine Plus needle	NovoFine Plus needle	BD ultrafine needle	BD ultrafine needle		NovoFine needle