



# คำถาม-คำตอบที่พบบ่อยเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19

## 1. วัคซีนโควิด 19 มีข้อห้ามใช้อะไรบ้าง

**ตอบ** ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ตัวยาสำคัญ และส่วนประกอบอื่น ๆ ในตำรับ ซึ่งมีความแตกต่างกันตามชื่อการค้า (ตามที่ระบุในเอกสารกำกับยาของวัคซีนแต่ละชื่อการค้า)

## 2. คำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 มีอะไรบ้าง

**ตอบ** ควรเน้นย้ำผู้มารับวัคซีนว่า วัคซีนไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ทั้งหมด แต่วัคซีนจะป้องกันการติดเชื้อแบบรุนแรงได้ดี ผู้รับวัคซีนยังคงต้องรักษามาตรการต่าง ๆ ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ และการรักษาระยะห่างทางสังคม เป็นต้น นอกจากนี้หากเกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรงจากวัคซีน ควรมาพบแพทย์

## 3. หากจำเป็นต้องได้รับวัคซีนอื่น ควรเว้นห่างจากวัคซีนโควิด 19 นานเท่าใด

**ตอบ** แนะนำให้เว้นห่างจากวัคซีนโควิด 19 อย่างน้อย 2-4 สัปดาห์ (ขึ้นกับชนิดของวัคซีนโควิด 19 และวัคซีนอื่น) เพื่อหลีกเลี่ยงปฏิกิริยาจากการฉีดวัคซีนพร้อมกัน แต่กรณีวัคซีนที่มีความจำเป็น เช่น วัคซีนป้องกันบาดทะยัก หรือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สามารถฉีดได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องเว้นระยะห่างจากวัคซีนโควิด 19

## 4. วัคซีนโควิด 19 ต่างชื่อการค้ากัน สามารถฉีดสลับกันได้หรือไม่

**ตอบ** ไม่ได้ เนื่องจากยังไม่มีการศึกษารองรับ

### เอกสารอ้างอิง

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาดปี 64 ของประเทศไทย [อินเทอร์เนต]. 2564 [เข้าถึงเมื่อ 18 มีนาคม 2564]. เข้าถึงได้จาก: <https://ddc.moph.go.th/uploads/files/1729520210301021023.pdf>

# Lamotrigine กับความเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

Lamotrigine เป็นยารักษาโรคลมชัก และโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว (bipolar disorder) ที่มีการใช้กันมานานมากกว่า 25 ปี

วันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (USFDA) ได้ทบทวนข้อมูลด้านความปลอดภัยของยา lamotrigine หลังจากพบรายงานว่า lamotrigine ทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะในผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจร่วมด้วย โดยพบความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ผู้ป่วยบางรายมีอาการเจ็บหน้าอก หอบหืด และหัวใจหยุดเต้น ในเบื้องต้นทาง USFDA ได้เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะในเอกสารกำกับยา และกำลังรวบรวมข้อมูลความเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเมื่อใช้ร่วมกับยารักษาโรคลมชักอื่น ๆ ได้แก่ carbamazepine, cenobamate, eslicarbazepine, fosphenytoin, lacosamide, oxcarbazepine, phenytoin, rufinamide, topiramate และ zonisamide

ทั้งนี้ USFDA แนะนำให้ประเมินประโยชน์กับความเสี่ยงจากยา lamotrigine ก่อนพิจารณาให้ยานี้แก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจร่วมด้วย

### เอกสารอ้างอิง

USFDA. Studies show increased risk of heart rhythm problems with seizure and mental health medicine lamotrigine (Lamictal) in patients with heart disease [cited March,31 2021]. Available from: <https://www.fda.gov/media/147183/download>

# วิธีบริหารยา Dilantin® ทาง Feeding tube

รูปแบบยา Dilantin® (Phenytoin) ที่ให้ทาง feeding tube (บริหารยาทุก 8 ชั่วโมง**)	
Infatab 50 mg 	Oral Suspension 125 mg/5 mL 
วิธีเตรียมยาก่อนนำไปบริหารทาง feeding tube	
บดเม็ดยาให้ละเอียด ตามขนาดยาที่แพทย์สั่ง นำมาผสมน้ำ 30 mL (ใช้ยาทันที)	ใช้ syringe ดูดยาตามปริมาณที่แพทย์สั่ง *เขย่าขวดก่อนใช้ทุกครั้ง*
วิธีบริหารยาทาง feeding tube	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ไล่สาย feeding tube ด้วยน้ำประมาณ 20-50 mL</li> <li>2. ดูดยาตามปริมาณที่แพทย์สั่งใส่ในสาย feeding tube</li> <li>3. ไล่สาย feeding tube ด้วยน้ำประมาณ 20-50 mL หลังการบริหารยา เพื่อป้องกันยาจับกับสาย feeding tube</li> </ol>	
บัญชียา / ราคาขาย	
ED (ก) / เม็ดละ 3.50 บาท	Non-ED / ขวดละ 508 บาท

**หมายเหตุ:** \*\*แนะนำให้บริหารยา Dilantin® ห่างจากการให้อาหารทางสายยาง (Enteral feeding) อย่างน้อย 2 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม phenytoin เป็นยากันชักที่มีช่วงการรักษาแคบ (narrow therapeutic index) ดังนั้นจึงควรมีการตรวจติดตามระดับยาในเลือดและอาการไม่พึงประสงค์ร่วมด้วย

### เอกสารอ้างอิง

1. Product information: Dilantin®, phenytoin, Pfizer, Thailand.  
2. MICROMEDEX® [Database on the internet]. Colorado: Thomson Reuters (Healthcare); c1974-2021. [cited 2021 May 3]. Available from: <https://www.micromedexsolutions.com>. Subscription required to view

# NEW ARRIVAL: Zavicefta® inj (Ceftazidime+Avibactam)

รูปแบบยา: ยาผงปราศจากเชื้อสำหรับละลายและเจือจาง  
ก่อนฉีด

## ส่วนประกอบ:

ยา 1 ขวดประกอบด้วย

ceftazidime 2 g และ

avibactam 500 mg

**ข้อบ่งใช้:** complicated intra-abdominal infection, complicated urinary tract infection รวมทั้ง pyelonephritis, hospital-acquired pneumonia รวมทั้ง ventilator associated pneumonia, Gram-negative bacteria infection ที่มีทางเลือกในการใช้ยาจำกัด

**การละลายผงยา:** ละลายผงยาด้วย SWI 10 mL จะได้ความเข้มข้น ceftazidime 167.3 mg/mL

**ความคงตัวหลังการละลายยา:** ใช้ยาทันทีหลังละลายผงยา

**การเจือจางก่อนบริหารยา:** เจือจางยา (ตามปริมาณที่แพทย์สั่ง) ด้วย D5W, NSS หรือ LRS จนได้ความเข้มข้นสุดท้ายอยู่ระหว่าง 8-40 mg/mL ของ ceftazidime

**การบริหารยา:** หยดเข้าหลอดเลือดดำมากกว่า 2 ชั่วโมง

**ความคงตัวหลังการเจือจางยา:** 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส และต้องให้ภายใน 12 ชั่วโมงหลังจากนำออกมาจากตู้เย็นแล้ว

\*\* ทั้งนี้มีคำแนะนำว่า กระบวนการตั้งแต่ละลายผงยาจนได้สารละลายเจือจางพร้อมหยดไม่ควรเกิน 30 นาที

## เอกสารอ้างอิง

Zavicefta® [package insert]. Thailand: Pfizer; 2017.



# NEW ARRIVAL: NUVIGIL® tab (Armodafinil)

NUVIGIL® (Armodafinil) เป็นยาใหม่ที่จะเริ่มจำหน่าย  
ในรพ.ศิริราช ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564

รูปแบบยา: ยาเม็ดสีขาวขนาด 150 mg และ 250 mg

**ข้อบ่งใช้ และขนาดยาที่แนะนำ:**

ยานี้ใช้เพื่อเพิ่มความตื่นตัวในผู้ที่มีภาวะง่วงนอนในช่วง  
กลางวันมากเกินไป ซึ่งเกิดจาก

- ภาวะง่วงเกิน
- ภาวะหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้น
- การนอนผิดปกติที่เกิดจากการทำงานเป็นกะ

โดยขนาดยาขึ้นกับแพทย์พิจารณา และแนะนำให้

รับประทานวันละ 1 ครั้ง ตอนท้องว่าง

**การออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา:** ยาออกฤทธิ์กระตุ้นระบบ  
ประสาท sympathetic อย่างอ่อน

**ข้อห้ามใช้:** ห้ามใช้ยานี้ในสตรีตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะ  
ตั้งครรภ์

**ราคา:** 150 mg ราคาเม็ดละ 184 บาท และ 250 mg ราคา  
เม็ดละ 197 บาท (ทั้งสองขนาดเป็นยานอกบัญชียาหลัก  
แห่งชาติ และจำกัดการสั่งใช้โดยแพทย์เฉพาะทาง)

## เอกสารอ้างอิง

NUVIGIL® [package insert]. USA: Anesta LLC; 2020.

สอบถามข้อมูลยาและพิษวิทยา โทร 9 - 7007

สอบถาม Medication Reconciliation (MR) โทร 9 - 6964

สอบถามเรื่องแพทย์ และประวัติการแพทย์ โทร 9 - 9555



## มีอะไรในฉบับนี้

- ❖ คำถาม-คำตอบที่พบบ่อยเกี่ยวกับ  
วัคซีนโควิด 19
- ❖ Lamotrigine กับความเสี่ยงของการ  
เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
- ❖ วิธีบริหารยา Dilantin® ทาง  
Feeding tube
- ❖ NEW ARRIVAL: Zavicefta® inj  
(Ceftazidime+Avibactam)
- ❖ NEW ARRIVAL: NUVIGIL® tab  
(Armodafinil)

ปีที่ 20 ฉบับที่ 8

เดือนพฤษภาคม 2564