


แจ้งยกเลิกจำหน่ายยา Genvoya® และรายการยาเพื่อพิจารณาเลือกใช้

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 บริษัทซีเอส ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด แจ้งยุติการนำเข้ายา Genvoya® เนื่องจากในปัจจุบันมียา Biktarvy® ซึ่งมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน แต่มีผลข้างเคียงและราคาต่ำกว่า ดังนั้นฝ่ายเภสัชกรรม รพ.ศิริราช จะเริ่มจำหน่ายยา Biktarvy® เมื่อยา Genvoya® หมด โดยข้อมูลเปรียบเทียบของยาทั้ง 2 รายการ เป็นดังนี้

รายการยา	Genvoya®	Biktarvy®
ชื่อสามัญทางยา*	elvitegravir/ cobicistat/ emtricitabine/ tenofovir alafenamide (150/150/200/10 mg)	bictegravir/ emtricitabine/ tenofovir alafenamide (50/200/25 mg)
บัญชียา	non-ED	non-ED
ราคา	102 บาท/เม็ด	87.50 บาท/เม็ด
รูปภาพยา		

วิธีบริหารยาฉีด Remdesivir (COVIFOR®)

รูปแบบยา/ความแรง: ผงยา

ปราศจากเชื้อ 100 mg บรรจุใน vial

ข้อบ่งใช้: ใช้รักษา COVID-19 ที่มี

อาการปอดอักเสบอย่างรุนแรง

ร่วมกับผู้ป่วยมีข้อห้ามในการบริหาร

ยาทางปาก หรือเป็นผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 1 ที่มีปอด

อักเสบ

การละลายผงยา: ละลายผงยาด้วย SWI 19 mL เขย่าทันที นาน 30 วินาที ตั้งทิ้งไว้ 2-3 นาที จะได้สารละลายใสไม่มีสี ถ้ายังละลายไม่หมด ให้ทำซ้ำในขั้นตอนเขย่าและตั้งทิ้งไว้ จนกว่ายาจะละลายหมด (หลังละลายมีความเข้มข้น 5 mg/mL)

การเจือจางก่อนบริหารยา: เจือจางยาที่ละลายแล้วด้วย NSS จนได้ปริมาตรรวม 100 mL หรือ 250 mL และให้กลับ infusion bag ขึ้น-ลง 20 ครั้งเพื่อผสมสารละลายให้เข้ากัน **ห้ามเขย่า**

การบริหารยา: หยดเข้าหลอดเลือดดำนาน 30-120 นาที

ความคงตัวหลังการละลาย และหลังการเจือจางยา: ยามีความคงตัว 4 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง (20-25 องศาเซลเซียส) หรือ 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส (ในตำรับยาไม่มีสารกันเสีย จึงแนะนำให้บริหารยาทันทีหลังเตรียมเสร็จ)

บัญชียา/การสั่งยา: เป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งจำกัดการสั่งใช้โดยแพทย์เฉพาะทาง และต้องใช้เอกสารประกอบการสั่งใช้ยา

เอกสารอ้างอิง

Product information: COVIFOR®, remdesivir. HETERO LABS LIMITED, Hyderabad, India.



วิธีบริหารยาฉีด Tocilizumab (Actemra®)

รูปแบบยา/ความแรง: สารละลายปราศจากเชื้อเข้มข้น บรรจุใน vial 80 mg/4 mL และ

400 mg/20 mL

ต้องเจือจางก่อนหยด

เข้าหลอดเลือดดำ

การเก็บรักษายาก่อนใช้: เก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส **กลไกการออกฤทธิ์:** ออกฤทธิ์ต้านตัวรับ interleukin-6 (IL-6)

ข้อบ่งใช้: ใช้รักษาโรค rheumatoid arthritis (moderate to severe) ที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้ดีด้วยยากกลุ่ม DMARDs, giant cell arteritis, systemic sclerosis-associated interstitial lung disease, polyarticular juvenile idiopathic arthritis, systemic juvenile idiopathic arthritis, cytokine release syndrome

การเจือจางก่อนบริหารยา (ขึ้นกับน้ำหนักตัวของผู้ป่วย):

- ผู้ใหญ่ และเด็กที่มีน้ำหนักตัว ≥ 30 kg: ใช้ NSS 100 mL
- เด็กที่มีน้ำหนักตัว < 30 kg: ใช้ NSS 50 mL

ก่อนเจือจางยา ต้องดูด NSS ออกมาให้เท่ากับปริมาณยา (ตามแพทย์สั่ง) ที่ดูดออกจาก vial หลังจากนั้นเติมยาลงไป กลับ infusion bag เมา ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดฟอง

การบริหารยา: หยดเข้าหลอดเลือดดำนานกว่า 1 ชั่วโมง

ความคงตัวหลังการเจือจางยา: ยามีความคงตัวทางกายภาพ และเคมีใน NSS นาน 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตามควรใช้ยาทันที หากยังไม่ได้ใช้ยาทันทีให้เก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง

เอกสารอ้างอิง

Actemra® [package insert]. USA: Roche; 2021.



แนะนำให้รู้จัก Akynzeo® cap (Netupitant+Palonosetron)

รูปแบบยา/ความแรง: ยารูปแบบ hard capsule ภายในบรรจุ
compressed tablet ของ

netupitant 300 mg (100 mg

3 เม็ด) และ soft gelatin

capsule ที่บรรจุ palonosetron 0.5 mg



กลไกการออกฤทธิ์: netupitant ออกฤทธิ์เป็น neurokinin-1
receptor antagonist, palonosetron ออกฤทธิ์เป็น 5-HT₃
receptor antagonist

ข้อบ่งใช้: ใช้สำหรับป้องกัน acute และ delayed nausea
vomiting ที่เกิดจากการให้เคมีบำบัดที่มีฤทธิ์เหนี่ยวนำอาการ
คลื่นไส้อาเจียน (moderately to highly emetogenic cancer
chemotherapy)

การบริหารยา: กลืนยาทั้งเม็ดพร้อมน้ำประมาณ 1 ชั่วโมงก่อน
ให้เคมีบำบัด กรณีให้ร่วมกับยารับประทาน dexamethasone
แนะนำให้ลดขนาดยา dexamethasone ลงครึ่งหนึ่ง

เนื่องจากไม่มีการศึกษาถึงความคงตัวและการละลายของ
ยาเมื่อให้ผ่าน NG tube จึงไม่แนะนำให้แกะ capsule ใดๆ
ก็ตาม หากผู้ป่วยไม่สามารถรับประทานยาได้ แนะนำให้แพทย์
พิจารณาใช้ palonosetron รูปแบบยาฉีดทดแทนยา Akynzeo®

ราคาขาย: ราคาเม็ดละ 3,023 บาท

บัญชียา: เป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ

เอกสารอ้างอิง

1. Akynzeo® [package insert]. Ireland: Helsinn Birex
Pharmaceuticals; 2018.

2. Product information: Akynzeo®, netupitant+palonosetron.
Mundipharma, Thailand.

Trelagliptin (Zafatek®) tab: ยารักษาโรคเบาหวาน ที่รับประทานสัปดาห์ละครั้ง

รูปแบบยา/ความแรง:

ยาเม็ดเคลือบฟิล์มขนาด

100 mg



กลไกการออกฤทธิ์: ยาออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์
dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4)

ข้อบ่งใช้ และขนาดยาที่แนะนำ: เป็นยาเสริมที่ใช้ร่วมกับการ
ควบคุมอาหารและออกกำลังกายเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลใน
เลือดให้ดีขึ้นในผู้ป่วยที่เป็น โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ปกติขนาด
ยาในผู้ใหญ่ คือ 100 mg (กลืนยาทั้งเม็ด) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ในวันเดียวกันของทุกสัปดาห์

ข้อห้ามใช้:

- เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบอื่นๆ ในยานี้
- เป็นโรคไตบกพร่องระดับรุนแรง หรือไตวายระยะสุดท้าย
ที่ต้องทำการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ราคาขาย: ราคาเม็ดละ 197 บาท

บัญชียา/การเบิกจ่าย: เป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ และ
จำกัดการใช้โดยแพทย์เฉพาะทาง

เอกสารอ้างอิง

Zafatek® [package insert].Japan: Takeda Pharmaceutical; 2018.

สอบถามข้อมูลยาและพิษวิทยา โทร 9 - 7007

สอบถาม Medication Reconciliation (MR) โทร 9 - 6964

สอบถามเรื่องแพ้ยา และประวัติการแพ้ยา โทร 9 - 9555



มีอะไรในฉบับนี้

- ❖ แจ้งยกเลิกจำหน่ายยา Genvoya®
และรายการยาเพื่อพิจารณาเลือกใช้
- ❖ วิธีบริหารยาฉีด Remdesivir
(COVIFOR®)
- ❖ วิธีบริหารยาฉีด Tocilizumab
(Actemra®)
- ❖ แนะนำให้รู้จัก Akynzeo® cap
(Netupitant+Palonosetron)
- ❖ Trelagliptin (Zafatek®) tab: ยารักษา
โรคเบาหวานที่รับประทาน
สัปดาห์ละครั้ง

ปีที่ 20 ฉบับที่ 9

เดือนมิถุนายน 2564