



พ่นยาฆ่าเชื้อ

ช่วยลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้หรือไม่

ข้อมูลโดย ชมรมนักปฏิบัติ เทคนิคการทำความสะอาด (Technical Cleaners) หน่วยทำความสะอาด งานอาคารสถานที่ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและสถานที่

การพ่นยาฆ่าเชื้อ ที่ใช้น้ำยาที่มีประสิทธิภาพและดำเนินการอย่างถูกวิธี จะช่วยทำความสะอาดให้ภายในบริเวณนั้นปลอดภัย ป้องกันการสะสมของเชื้อหลังการฉีดพ่นไปได้ 99.99 % ลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดที่สะสมอยู่บนพื้นผิวในบริเวณที่ฉีดพ่นได้ การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ก็เป็นอีกทางเลือกที่ดี เพราะจะทำให้พื้นที่สะอาด และปลอดภัย



5 ขั้นตอนการอบพ่นยาฆ่าเชื้อ Covid-19

ประสานหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

01

ติดต่อ หน่วยรักษาความสะอาด งานอาคารสถานที่
ตึกชลพัฒนา ชั้น 2 โทร.9-7225, Ekocall 66262

เคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ออกจากบริเวณที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
และเก็บอาหารให้มีมิดชิด ทำการปิดคลุมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และปิดระบบระบายอากาศ

02

จัดเตรียมสถานที่

เจ้าหน้าที่จะทำการฆ่าเชื้อในอากาศจะใช้วิธีการพ่นละอองฝอย
เพราะสามารถกระจายน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีอนุภาคขนาดเล็กเข้าสู่บริเวณ
ที่ยากต่อการเข้าถึง ตัวอย่างบริเวณมุมห้องและพื้นละอองฝอย
จะค่อย ๆ ตกหล่นบนพื้นผิวภายในห้อง

เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ดำเนินการ

03

ปิดบริเวณที่ได้รับการฆ่าเชื้ออย่างน้อย
1-3 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
ก่อนที่จะเปิดพื้นที่เพื่อระบายอากาศ

04

การจัดการพื้นที่ หลังการดำเนินการ

5.1 กรณีใช้แผ่นพลาสติกคลุมคอมพิวเตอร์เครื่องใช้
ไฟฟ้าและปลั๊กไฟไว้ ขณะนำแผ่นพลาสติกออกให้ระวัง
เศษละอองน้ำยาที่อาจยังมีตกค้างไหลลงเครื่อง
คอมพิวเตอร์และปลั๊กไฟ



5.2 การทำความสะอาดหลังฉีดพ่นน้ำยาแล้ว แนะนำให้ใช้
น้ำยาเวอร์คอน (Virkon) ปริมาณ 5 กรัม จำนวน 8 ชอง
ผสมน้ำในอัตราส่วน 4 ลิตร ใช้กับพื้นที่ 13 ตารางเมตร
ทำความสะอาดทั่วพื้นผิว



5.3 การทำความสะอาดโต๊ะและอุปกรณ์สำนักงานให้ใช้แอลกอฮอล์ 70%
เช็ดทำความสะอาด

อัตราส่วนผสม CHEMGENE HLD4H

อัตราส่วน	น้ำยา	น้ำเปล่า
1:100	10ML	100ML



ผ่านการรับรองจาก Blu Test จากประเทศอังกฤษ และมหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา
ทุกคนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
ได้แก่ การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากผ้าหรือ
หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะเมื่อไปในที่สาธารณะ
หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น
ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ และน้ำหรือแอลกอฮอล์ทุกครั้ง
ก่อนทำกิจกรรมต่าง ๆ หรือหลังสัมผัสจุดที่ใช้ร่วมกันบ่อย ๆ
เช่น ลูกบิดประตู ราวจับหรือราวบันได เมื่อกลับถึงบ้าน
ควรอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับ
คนกลุ่มเสี่ยงที่เมื่อเกิดโรคแล้วอาจมีอาการรุนแรง ได้แก่
ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เป็นต้น

