

ยาใหม่: Elobixibat hydrate (Goofice®) เริ่มจำหน่ายตุลาคม 2565



รูปแบบยา: ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม เม็ดกลม สีเหลืองอ่อน ขนาด 5 mg
ข้อบ่งใช้ และขนาดยาที่แนะนำ: รักษาโรคท้องผูกเรื้อรัง ขนาดยา
ในผู้ใหญ่ คือ 10 mg วันละครั้ง ก่อนอาหาร ขนาดยาปรับเปลี่ยนได้
ตามอาการ แต่ขนาดยาสูงสุดไม่เกิน 15 mg ต่อวัน

กลไกการออกฤทธิ์: ยายอกฤทธิ์ยับยั้งตัวขนส่งกรดน้ำดี (ileal bile
acid transporter - IBAT) ที่ลำไส้เล็กส่วนปลาย (terminal
ileum) ทำให้น้ำดีคงอยู่ในลำไส้และส่งผ่านเข้าสู่ลำไส้ใหญ่มากขึ้น
โดยกรดน้ำดีจะกระตุ้นการหลั่งน้ำและเกลือแร่ และกระตุ้นการบีบ
ตัวของลำไส้ใหญ่

อาการไม่พึงประสงค์: ปวดท้อง ท้องเสีย ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ
ร้อนวูบวาบ

ข้อห้ามใช้:

- ผู้ป่วยที่แพ้ยาหรือส่วนประกอบของยานี้
- ผู้ป่วยที่มีภาวะลำไส้อุดตัน จากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม เช่น เนื้องอก
ในลำไส้หรือไส้เลื่อน หรือมีข้อสงสัยว่าอาจเกิดจากภาวะเหล่านั้น
ซึ่งการใช้ยาอาจทำให้อาการรุนแรงขึ้น

ข้อห้ามใช้/การสั่งยา: เป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (non-ED)

ซึ่งจำกัดการสั่งใช้โดยแพทย์เฉพาะทาง

ยาเริ่มจำหน่าย: ตุลาคม 2565

เอกสารอ้างอิง

Goofice® [package insert]. Thailand: Eisai. 2020.

การบริหารยา: Isavuconazole (Cresemba®)
IV infusion ต้องใช้ in-line filter ที่ให้มาในกล่องยา
รูปแบบยา/ความแรง:

ผงยาปราศจากเชื้อ isavuconazole
200 mg (อยู่ในรูป isavuconazonium
sulfate 372.6 mg) บรรจุใน vial

ข้อบ่งใช้: ใช้รักษาโรคติดเชื้อราบางชนิด
ในผู้ใหญ่ คือ - Invasive aspergillosis

- Mucormycosis ในผู้ที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้ amphotericin B
การละลายผงยา: ละลายผงยาด้วย SWI 5 mL เขย่าจนได้
สารละลายใส แล้วนำไปเจือจางต่อทันที

การเจือจางก่อนบริหารยา: เจือจางยา 200 mg ที่ละลายแล้วด้วย
D5W หรือ NSS อย่างน้อย 250 mL (ความเข้มข้นสูงสุด 0.8
mg/mL) และให้กลิ้ง infusion bag เบา ๆ เพื่อผสมสารละลายให้
เข้ากัน หลีกเลี่ยงการเขย่า

ความคงตัวหลังการเจือจางยา: หลังการเจือจาง ควรใช้ยาทันที
ภายใน 6 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง 15-25 องศาเซลเซียส หากไม่ได้ใช้
ทันที ควรเก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสและรวมเวลาที่
ให้ IV infusion จะต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมง

การบริหารยา: หดยาเข้าหลอดเลือดดำ (IV infusion) นานอย่าง
น้อย 1 ชั่วโมง โดยต้องหดยาผ่าน infusion set ที่ต่อกับ in-line
filter (0.2 micron) ที่ให้มาในกล่อง

การเก็บรักษายาก่อนใช้: เก็บในตู้เย็น (2-8 องศาเซลเซียส)

บัญชียา/การสั่งยา: เป็นยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (non-ED)
ซึ่งจำกัดการสั่งใช้โดยแพทย์เฉพาะทาง

ราคา/การเบิกจ่าย: 19,537 บาท เบิกไม่ได้ทุกสิทธิการ
รักษาพยาบาล

เอกสารอ้างอิง

CRESEMBA® [package insert]. Thailand: Pfizer. 2020.



แนะนำคู่มือการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง ฉบับปรับปรุงล่าสุด

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด
โรงพยาบาลศิริราชได้ประกาศใช้ “คู่มือการใช้
ยาที่มีความเสี่ยงสูง” พิมพ์ครั้งที่ 6 เมษายน
2565 (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งในฉบับนี้ได้ให้คำ
นิยามของยาที่มีความเสี่ยงสูง (High Alert
Drug) ว่าหมายถึง “กลุ่มยาที่อาจก่ออันตราย
อย่างรุนแรงได้ถ้านำไปใช้ไม่ถูกต้อง หรือเมื่อใช้ยาผิดพลาด ซึ่งอาจจะ
พบได้บ่อยหรือไม่ก็ได้ รวมถึงกลุ่มยาที่มีดัชนีการรักษาแคบ หากมีเหตุ
ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับยาในเลือด แม้จะใช้อย่าง
ถูกต้อง ก็อาจนำไปสู่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในระดับรุนแรงต่อผู้ป่วย
ได้”

ในส่วนของเนื้อหาที่มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย ครอบคลุม
รายการยาที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือการเพิ่ม
รายการกลุ่มยาเคมีบำบัดที่มีพิษต่อเซลล์เข้ามาเป็นรายการยาที่มี
แนวทางการติดตามอย่างชัดเจน รวมไปถึงการเพิ่มยาบางรายการให้
เป็นยาที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ Direct Oral Anticoagulants
(DOACs) ยาลดความดันโลหิตที่ให้ทางหลอดเลือดดำ และยา
เบาหวานชนิดรับประทาน

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้
ยาที่มีความเสี่ยงสูงได้จากโปรแกรม
Siriraj Drug List และเว็บไซต์ของงาน
จัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล (scan QR code)

เอกสารอ้างอิง

High Alert Drug คู่มือการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง [อินเทอร์เน็ต]. พิมพ์ครั้งที่ 6 เมษายน 2565 (ฉบับ
ปรับปรุง). กรุงเทพฯ: คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด โรงพยาบาลศิริราช; 2565 [เข้าถึงเมื่อ 4
ก.ค. 2565]. เข้าถึงได้จาก: [https://www2.si.mahidol.ac.th/km/cop/clinical/
medicationsafety/highalertdrug/7684/](https://www2.si.mahidol.ac.th/km/cop/clinical/medicationsafety/highalertdrug/7684/)



ADR: องค์การเภสัชกรรมเพิ่มคำเตือนบนฉลากยา Primaquine เรื่อง haemolytic anaemia และ haemolysis



Primaquine เป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคมาลาเรียที่เกิดจากเชื้อ *Plasmodium vivax* หรือ *Plasmodium ovale* โดยใช้ร่วมกับยารักษาโรคมาลาเรียชนิดอื่น เช่น chloroquine องค์การเภสัชกรรมซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรายการยา Primaquine tablet 15 mg ได้แจ้งแก้ไขข้อความบนฉลากยาโดยเพิ่มคำเตือนการใช้ยา (scan QR code) ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว ดังนี้



ฉลากยาเดิม	ฉลากยาใหม่
ไม่ระบุคำเตือน	เฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง ได้แก่ haemolytic anaemia และ haemolysis

อาการที่น่าสงสัยว่าจะเกิด haemolytic anaemia (ภาวะโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงแตก) และ haemolysis (ภาวะเม็ดเลือดแดงแตก) เช่น รู้สึกซีดลง ปัสสาวะมีสีเข้มขึ้นหรือดำ รู้สึกอ่อนเพลีย ตัวเหลืองตาเหลือง หากเกิดอาการดังกล่าวให้หยุดยา primaquine ทันทีแล้วมาพบแพทย์

บัญชียา/การสั่งยา: เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (บัญชียา: ก)/ ไม่จำกัดรหัสแพทย์ในการสั่งใช้ยา

ราคาขาย/การเบิกจ่าย: 1.50 บาทต่อเม็ด/ เบิกได้ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล

เอกสารอ้างอิง

- หนังสือเวียนฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่ อว.78.072/Eng1412/2565 วันที่ 27 พ.ค. 2565. เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อความบนฉลากรายการยา Primaquin Tab 15 mg
- กองโรคติดต่อภายในโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางเวชปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย พ.ศ. 2564. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์อักษรกราฟิกพิกแอนด์ดีไซน์; 2564. หน้า 21.

พิษวิทยา: กัญชา – กัญชง



ภาพจาก: <https://www.doe.go.th>

สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ประกาศปลดล็อกกัญชา-กัญชงจากการเป็นยาเสพติด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยที่เกิดอาการผิดปกติภายหลังการสัมผัสกัญชา-กัญชงมากขึ้น ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2565 ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลศิริราชได้ให้คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยที่เกิดอาการผิดปกติภายหลังการสัมผัสกัญชา-กัญชง จำนวน 13 คน (อายุ ≥ 18 ปี 12 คน และอายุ <18 ปี 1 คน) โดยเป็นจำนวนผู้ป่วยในเดือน มิ.ย. 2565 จำนวน 6 คน

ภาวะพิษเฉียบพลันจากกัญชา-กัญชง: อาการผิดปกติที่มักพบในผู้ป่วยที่เริ่มใช้กัญชา-กัญชง ได้แก่ กล้ามเนื้ออ่อนแรง มือสั่น เหนื่อยชา ง่วงซึม ความดันโลหิตต่ำจากการเปลี่ยนอริยาบถ ไม่มีสมาธิ พูดไม่ชัด ตอบสนองช้า กระสับกระส่าย ชัก เกิดความผิดปกติทางจิต วิดตกำเริบ ใจสั่น เจ็บหน้าอก หายใจลำบาก และไตวายเฉียบพลัน

การรักษาภาวะพิษเฉียบพลันจากกัญชา-กัญชง: เป็นการให้การรักษาตามอาการ ไม่มียาต้านพิษที่จำเพาะ ได้แก่ การให้ diazepam ทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยที่มีอาการกระสับกระส่ายหรือ ชัก เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง

Lapoint JM. Cannabinoids. In: Nelson LS, Howland MA, Lewin NA, Smith SW, et al, editors. Goldfrank's Toxicologic Emergencies. 11th ed. New York: McGraw-Hill Education; 2019. p.1111-21.

สอบถามข้อมูลยาและพิษวิทยา โทร 9-7007
สอบถาม Medication Reconciliation (MR) โทร 9-6964
สอบถามเรื่องแพ้ยา และประวัติการแพ้ยา โทร 9-9555



มีอะไรในฉบับนี้

- ยาใหม่: Elobixibat hydrate (Goofice[®]) เริ่มจำหน่ายตุลาคม 2565
- การบริหารยา: Isavuconazole (Cresemba[®]) IV infusion ต้องใช้ in-line filter ที่ให้มาในกล่องยา
- แนะนำคู่มือการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง ฉบับปรับปรุงล่าสุด
- ADR: องค์การเภสัชกรรมเพิ่มคำเตือนบนฉลากยา Primaquine เรื่อง haemolytic anaemia และ haemolysis
- พิษวิทยา: กัญชา – กัญชง

ปีที่ 21 ฉบับที่ 10
เดือนกรกฎาคม 2565