



ชัวร์ก่อนแชร์

โรคฝีดาษลิง

Monkeypox

FACTSHEET



1

โรคฝีดาษลิง คืออะไร

โรคฝีดาษลิง หรือโรคฝีดาษวานร คือโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่ม Poxvirus ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับกับโรคฝีดาษหรือไข้ทรพิษ โดยมีลักษณะและรูปร่างของผื่นคล้ายคลึงกัน มีพาหะมาจากสัตว์ตระกูลลิง หรือสัตว์ที่มีฟันแทะ เช่น หนู กระรอก เริ่มมีการระบาดในทวีปแอฟริกา แพร่กระจายไปยังทวีปอื่นๆ ผ่านการเดินทางของนักเดินทางหรือสัตว์ที่นำเข้ามาจากแอฟริกา

ในปัจจุบันพบว่า สามารถแพร่จากคนสู่คนได้ จากการสัมผัสโดยตรงที่ผิวหนังบริเวณที่มีตุ่มผื่น หรือจากการ ไอ จาม จากละอองฝอยของทางเดินหายใจ

2

อาการของโรค

หลังจากสัมผัสโรคหรือติดเชื้อ จะเริ่มมีอาการมีไข้ ปวดเมื่อยร่างกาย ท้องเสีย หรืออาเจียนภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์

หลังจากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์ จะเริ่มมีตุ่มขึ้นบนผิวหนังเป็นผื่นแดง จากนั้นตุ่มทั้งหมดจะกลายเป็นตุ่มน้ำ ตุ่มหนอง จนกระทั่งแตกเป็นแผล และตกสะเก็ด

มักพบผู้ป่วยที่มีอาการต่อม้ำเหลืองโตร่วมด้วยค่อนข้างบ่อย คลำพบก้อนโตที่ใต้คาง ลำคอ รักแร้ หรือขาหนีบ หากมีอาการดังกล่าวควรมาพบแพทย์



3

ความรุนแรงของโรค

โรคฝีดาษลิงมีความรุนแรงน้อยกว่าโรคฝีดาษ มีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างต่ำ และแพร่กระจายได้ยากกว่า โดยผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต คือ ผู้ที่มีร่างกายไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นต้น

4

การรักษา

ในปัจจุบันใช้การรักษาแบบประคับประคองตามอาการ เช่น ยาลดไข้ กรณีที่มีอาการป่วยรุนแรง ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส



5

การป้องกันโรค

1. ไม่สัมผัสกับสัตว์ตระกูลฟันแทะ โดยเฉพาะสัตว์ที่นำเข้ามาจากทวีปแอฟริกา
2. ระมัดระวังการสัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ที่ติดเชื้อ และผู้ที่คาดว่าจะติดเชื้อโรคฝีดาษลิง
3. หากมีอาการและสงสัยว่าตนเองติดเชื้อฝีดาษลิง ให้รีบพบแพทย์ทันที



สามารถรับชมวิดีโอทัศนสารความรู้อื่น ๆ
ของชัวร์ก่อนแชร์ ได้ทาง QR code

ภาควิชาตจวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

