

ชัวร์ก่อนแชร์ จริงหรือ ? ฉีดโบท็อกซ์ อาจทำให้ ตาตก



“ฉีดโบท็อกซ์ (Botox)” ทำให้ตาตก?

การใช้โบทูลินั่มท็อกซินในการรักษาริ้วรอยบริเวณรอบดวงตา นั้นมีโอกาส 1 ใน 1000 ราย ที่จะทำให้เกิดผลข้างเคียง คือ ตาตกได้ เนื่องจากกล้ามเนื้อที่ทำให้เกิดริ้วรอยนั้นอยู่ใกล้กับกล้ามเนื้อเกี่ยวกับการเปิดตา หากโบทูลินั่มท็อกซิน เข้าไปอยู่บริเวณกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตาจะส่งผลให้ไปยับยั้งการทำงานของกล้ามเนื้อเปิดตาจึงทำให้ตาตก หรือลืมตาไม่ขึ้นได้



สาเหตุ

- คนไข้มีลักษณะกล้ามเนื้อรอบดวงตาไม่เหมือนกับคนทั่วไป อาจทำให้เกิดการฉีดขาดตำแหน่งได้
- การทำกิจกรรมที่กระทบต่อกล้ามเนื้อบริเวณที่ฉีดโบทูลินั่มท็อกซิน เช่น การนอน, การนวด เป็นต้น ทำให้โบทูลินั่มท็อกซินไหลกระจายไปในตำแหน่งกล้ามเนื้อข้างเคียงที่ไม่ต้องการอาจส่งผลทำให้ตาตกได้



การลดความเสี่ยง

1. ไม่ควรนอนราบ ในช่วง 3-4 ชั่วโมงหลังการรักษา
2. ห้ามนวดในบริเวณที่ทำการรักษาเนื่องจาก อาจทำให้ยากระจายไปยังบริเวณที่ไม่ต้องการรักษาได้
3. พบแพทย์ตามนัดเพื่อประเมินผลการรักษา เมื่อพบความผิดปกติใดเกิดขึ้นควรแจ้งให้แพทย์ทราบเพื่อที่จะได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง



ถ้าตาตกแล้วจะแก้ไขอย่างไร ?

1. **กรณีตาไม่ตกเยอะจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต** แนะนำให้รอจนหายเอง เนื่องจากโบทูลินั่มท็อกซินมีฤทธิ์อยู่ได้นาน 3-4 เดือน หลังจากนั้นจะหมดฤทธิ์และกล้ามเนื้อจะค่อยๆกลับมาหดตัวได้เหมือนเดิม
2. **กรณีไม่อยากรอให้หายเอง** สามารถใช้ยาหยอดตาเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อเปิดตาทำงานได้ดีขึ้น ข้อยเสีย คือ ยาออกฤทธิ์ได้แค่ช่วงสั้นๆ จึงต้องหยอดตาบ่อย และอาจจะทำให้ตาแห้งได้
3. **กรณีจำเป็นจริงๆ** อาจใช้โบทูลินั่มท็อกซินไปปรับสมดุลการทำงานของกล้ามเนื้อที่มีปัญหา ซึ่งจะต้องทำการรักษาโดยแพทย์ที่มีความชำนาญ
4. **กรณีเสี่ยงแก่ชีวิต** เช่น หายใจไม่ออก แพทย์จะใช้ยาฉีดในกรณีฉุกเฉินเพื่อดันฤทธิ์การทำงานของโบทูลินั่มท็อกซิน

! ข้อควรระวัง

การใช้สาร Botulinum toxin ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเสมอ ผลข้างเคียงจะลดลงหากได้รับการรักษาจากแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญ

