

Codeine

ออกฤทธิ์เหมือน“ฝิ่น”



ข้อบ่งชี้ :

เพื่อรักษาอาการปวดระดับปานกลาง
รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด ทุก 6-8 ชม. เวลามีอาการ

ข้อควรระวัง :

ระวัง กินยาเกินขนาด

- ขนาดยาสูงสุดไม่เกิน 360 มก. ต่อวัน
- ควรปรับลดขนาดยาลงตามการ
ทำงานของไต



ระวัง พาราเซตามอลเกินขนาด

- ในท้องตลาดมียาผสม
พาราเซตามอล + Codeine เช่น
Tylenol with codeine (TWC),
Codegesic
- ระวังไม่ให้ยาพาราเซตามอลเกินครั้ง
ละ 1 กรัม และไม่เกินวันละ 4 กรัม



ระวัง เด็ก และ หญิงให้นมบุตร

- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
- ระวังในหญิงให้นมบุตร ยาอาจมี
ผลต่อทารก



ระวัง ยาแก้ไอและยาแก้ท้องเสีย

- อาจมียา Codeine ผสมอยู่ หากกิน
ร่วมกันอาจทำให้ยาเกินขนาดได้



ระวัง ติดยา

- ใช้เฉพาะเวลามีอาการปวด ใช้เท่าที่จำเป็น
- หลีกเลี่ยงการใช้ยาติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน

ผลข้างเคียง :

• ท้องผูก



• ง่วงซึม



• กัดการหายใจ



Tramadol

ออกฤทธิ์เหมือน“ฝิ่น”



ข้อบ่งชี้ :

เพื่อรักษาอาการปวดระดับปานกลางหรือรุนแรง
รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด ทุก 6-8 ชม. เวลามีอาการ

ข้อควรระวัง :



ระวัง กินยาเกินขนาด

- ขนาดยาสูงสุดไม่เกิน 400 มก.ต่อวัน
- ควรปรับลดขนาดยาลงตามการทำงานของไต



ระวัง ติดยา

- ใช้เฉพาะเวลามีอาการปวด ใช้เท่าที่จำเป็น
- หลีกเลี่ยงการใช้ยาติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน



ระวัง พาราเซตามอลเกินขนาด

- ในท้องตลาดมียาผสม พาราเซตามอล + Tramadol เช่น Ultracet, Duocet
- ระวังไม่ให้ยาพาราเซตามอลเกินครั้งละ 1 กรัม และไม่เกินวันละ 4 กรัม



ระวัง ในคนที่ใช้ยาทางจิตเวช

- ควรปรึกษาแพทย์ถ้ามีการใช้ยาทางจิตเวชร่วมด้วย
- ไม่ควรใช้ในคนใช้โรคลมชัก



ระวัง เด็ก

- ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี



ระวัง คนสูงอายุ

- อาจทำให้เกิดภาวะสับสนเฉียบพลัน เดินเซล้มได้



ระวัง ผิดกฎหมาย

- จำยาภายใต้คำสั่งของแพทย์เท่านั้น



ผลข้างเคียง :



เวียนศีรษะ, คลื่นไส้/อาเจียน



ท้องผูก



ง่วงซึม หมดสติ กดการหายใจ โคม่า



หัวใจเต้นเร็ว ใจสั่น



กล้ามเนื้อเกร็ง กระตุก ชัก

