




ผังแนวทางดูแลการรักษา (CPG) ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีภาวะ severe sepsis/septic shock*



- ควรระวังในผู้ป่วยอายุมาก ผู้ป่วยที่มี underlying disease เช่น heart disease, renal failure
- ประเมิน intravascular volume โดยการตรวจร่างกาย : เป้าหมาย JVP 3-5 cmH₂O above sternal angle
- Acceptable BP หมายถึง เป้าหมาย mean arterial pressure (MAP) ≥ 65 mmHg
- () หมายถึง เอกสารแนบ ดังนี้ (1) แนวทางการคัดกรองและวินิจฉัยผู้ป่วย severe sepsis และ septic shock (2) แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีภาวะ severe sepsis/septic shock (3) แนวทางการเพาะเชื้อจากเลือด (Hemoculture) แนวทางในการเก็บปัสสาวะเพื่อส่งตรวจเพาะเชื้อ (4) แนวทางการให้ยาปฏิชีวนะ (5) แนวทางการปรึกษาทีมศัลยกรรม

* ประยุกต์จากแนวทางที่สาขาเวชบำบัดวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์จัดทำขึ้น และ Dellinger RP, Levy MM, Carlet JM, et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock, 2008 และ 2012