



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

ยาที่อาจต้องหยุดก่อนผ่าตัด

ภญ. วิภา ธรรมทินโน

Medication Reconciliation
Ambulatory Care, Pharmacy Department, Siriraj Hospital

Edit 15/01/2026

สรุปกลุ่มยาที่อาจต้องพิจารณาก่อนการผ่าตัด

กลุ่มยา	ตัวอย่าง	ระยะเวลาที่งดก่อนผ่าตัด	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
1. Antiplatelets	Aspirin, Clopidogrel, Cilostazol, Ticlopidine, Ticagrelor, Prasugrel	ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์	เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกผิดปกติ
2. Anticoagulants	Warfarin, Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban	ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์	เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกผิดปกติ
3. ยาเบาหวานกลุ่ม SGLT-2 inhibitors (ลงท้ายด้วย gliflozin)	Canagliflozin, Dapagliflozin, Empagliflozin, Luseogliflozin	3 วันก่อนผ่าตัด	เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดเป็นกรดจากสารคีโตน โดยระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในค่าปกติ
4. ยาเบาหวานกลุ่ม GLP-1 Receptor Agonists (ลงท้ายด้วย glutide)	- Dulaglutide - Semaglutide - Semaglutide tablet	GLP-1 ที่ฉีดสัปดาห์ละครั้ง หรือ Long-acting ให้งด 1 สัปดาห์ก่อนผ่าตัด	เพิ่มความเสี่ยงต่อการสำลักสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหาร ระหว่างการระงับความรู้สึกทั่วไป หรือ การดมยาสลบ
	- Liraglutide - Liraglutide + Insulin degludec - Lixisenatide + Insulin glargine	GLP-1 ที่ใช้วันละครั้ง ให้งดเช้าวันผ่าตัด	
5. ยาเบาหวานกลุ่ม Dual GIP/GLP-1 Receptor Agonists	- Tirzepatide	GLP-1 ที่ฉีดสัปดาห์ละครั้ง หรือ Long-acting ให้งด 1 สัปดาห์ก่อนผ่าตัด	
6. อาหารเสริม สมุนไพร	โสม ใบแปะก๊วย กระเทียม ชิง ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร วิตามินซี/ อี ขนาดสูง Coenzyme Q10	2 สัปดาห์ก่อนผ่าตัด	เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกผิดปกติ

ยาที่อาจต้องหยุดก่อนผ่าตัด

(เฉพาะรายการยาที่มีจำหน่ายในโรงพยาบาลศิริราช)



- ยาต้านการเกาะตัวของเกล็ดเลือด (Antiplatelet Drugs)

Aspirin (B-Aspirin [®] , Asprex [®] , Cardiprin [®] ASA)	Ticlopidine (Ticlodin [®])
Clopidogrel (Platogrix [®] , Apolets [®] , Clopidogrel GPO [®] , Clopidogrel SANDOZ [®])	Ticagrelor (Brilinta [®] , Tgrelor [®] , Ticata [®])
Cilostazol (Pletaal [®] , Cilosol [®] , Bestazol [®])	Prasugrel (Effient [®])

- ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด (Anticoagulant Drugs)

<ul style="list-style-type: none">Parenteral<ul style="list-style-type: none">- Unfractionated heparin- Enoxaparin (Clexane[®], Thenox[®])- Tinzaparin (Innohep[®])- Bemiparin (Hibor[®])- Fondaparinux (Arixtra[®])	<ul style="list-style-type: none">Oral<ul style="list-style-type: none">- Warfarin (Maforan[®])- Dabigatran (Pradaxa[®])- Rivaroxaban (Xarelto[®], Rivaxored[®])- Apixaban (Eliquis[®], Sandoz[®])- Edoxaban (Lixiana[®])
---	--

ยาที่อาจต้องหยุดก่อนผ่าตัด

(เฉพาะรายการยาที่มีจำหน่ายในโรงพยาบาลศิริราช)

- ยาเบาหวานกลุ่ม SGLT-2 inhibitors

รูปแบบยา	ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	ขนาด
ยาเดี่ยว	Canagliflozin	Invokana	100 mg 300 mg
	Dapagliflozin	Forxiga	10 mg
	Empagliflozin	Jardiance	10 mg 25 mg
	Luseogliflozin	Lusefi	2.5 mg 5 mg
ยาผสม	Canagliflozin+Metformin	Vokanamet	50/500 mg และ 150/500 mg
	Dapagliflozin+Metformin	Xigduo XR	10/1,000 mg 5/1,000 mg
	Empagliflozin+Metformin	Jardiance Duo	12.5/1,000 mg 5/1,000 mg 12.5/500 mg 5/500 mg
	Empagliflozin+Linagliptin	Glyxambi	10/5 mg 25/5 mg

**ตัวอักษรสีแดงคือไม่มีจำหน่ายใน รพ.ศิริราช ข้อมูล ณ.วันที่ 15/01/2026

ยาที่อาจต้องหยุดก่อนผ่าตัด

(เฉพาะรายการยาที่มีจำหน่ายในโรงพยาบาลศิริราช)



มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล


- ยาเบาหวานกลุ่ม GLP1-Receptor Agonists

GLP1-Receptor Agonists	Medication*
Daily dosing	<ul style="list-style-type: none">- Liraglutide (Saxenda[®])- Liraglutide + Insulin degludec (Xultophy[®])- Lixisenatide+Insulin glargine (Soliqua[®])- Semaglutide tablet (Rybelsus[®])
Weekly dosing	<ul style="list-style-type: none">- Dulaglutide (Trulicity[®])- Semaglutide (Ozempic[®], Wegovy[®])- Tirzepatide (Mounjaro[®])

ยาต้านการเกาะตัวของเกล็ดเลือด (Antiplatelet Drugs)

Aspirin (แอสไพริน)

มี 3 ขนาด คือ 81, 100, 300 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Aspirin 81 mg (แอสไพริน)	B-Aspirin (บี-แอสไพริน)	
Aspirin 100 mg (แอสไพริน)	Cardiprin ASA (คาร์ดีปรีน เอเอสเอ)	
Aspirin 300 mg (แอสไพริน)	Asprex (แอสเพร็กซ์)	

Aspirin 81 mg (แอสไพริน)

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Aspirin 81 mg (แอสไพริน)</p>	<p>B-Aspirin (บี-แอสไพริน)</p>	

Aspirin 100 mg (แอสไพริน)

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Aspirin dispersible tablet 100 mg (แอสไพริน)</p>	<p>Cardiprin ASA (คาร์ดิพรีน เอเอสเอ)</p>	 

Aspirin EC 300 mg (แอสไพรีน)

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Aspirin 300 mg (แอสไพรีน)</p>	<p>Asprex (แอสเพรกซ์)</p>	 <p>The image shows the ASPrex 300mg packaging, which includes a box and a blister pack. The box is white with green and red accents and features the text 'ASPrex 300' and '50 x 10 Tablets'. The blister pack contains 50 tablets, each individually wrapped in a white and green foil. A close-up of two tablets is shown above the blister pack, with a ruler indicating they are approximately 1.5 cm in diameter. The tablets are white and round.</p>

Clopidogrel (โคลพิโดเกรล)

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Clopidogrel 75 mg (โคลพิโดเกรล)</p>	<p>Apolets (อะโปเลท)</p>	  

Clopidogrel (โคลพิโดเกรล)

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Clopidogrel 75 mg (โคลพิโดเกรล)</p>	<p>Clopidogrel GPO (โคลพิโดเกรล จีพีโอ)</p>	  

Clopidogrel (โคลพิโดเกรล)

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Clopidogrel 75 mg (โคลพิโดเกรล)</p>	<p>Platogrix (พลาโทกริก)</p>	

Cilostazol (ซิลอสตาซอล)

มี 2 ขนาด คือ 50 mg และ 100 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Cilostazol 50 mg (ซิลอสตาซอล)</p>	<p>Cilosol (ซีโลซอล)</p>	 

Cilostazol (ซิลอสตาซอล)

มี 2 ขนาด คือ 50 mg และ 100 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Cilostazol 50 mg (ซิลอสตาซอล)	Bestazol (เบสตาซอล)	 

Cilostazol (ซิลอสตาซอล)

มี 2 ขนาด คือ 50 mg และ 100 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Cilostazol 100 mg (ซิลอสตาซอล)	Bestazol (เบสตาซอล)	

Cilostazol (ซิลอสตาซอล)

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Cilostazol 100 mg (ซิลอสตาซอล)</p>	<p>Pletaal SR (พลีทาล แอสอาร์)</p>	

Cilostazol Powder

(ซิลอสตาซอล)

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Cilostazol Powder 100 mg/ sachet (ซิลอสตาซอล)</p>	<p>Pletaal Powder 20% (พลีทาล)</p>	

Ticlopidine (ทีโคลพิดีน)

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Ticlopidine 250 mg (ทีโคลพิดีน)</p>	<p>Ticlofin (ทีโคลติน)</p>	  

Ticagrelor (ทिकाกริเลอ์)

มี 2 ขนาด คือ 60 mg และ 90 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Ticagrelor 60 mg (ทिकाกริเลอ์)	Brilinta (บริลินต้า)	

Ticagrelor (ทिकाกริเลอ์)

มี 2 ขนาด คือ 60 mg และ 90 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Ticagrelor 60 mg (ทिकाกริเลอ์)	Tgrelor (ทิกรีลอร์)	  

Ticagrelor (ทिकाกริเลอ์)

มี 2 ขนาด คือ 60 mg และ 90 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Ticagrelor 90 mg (ทिकाกริเลอ์)</p>	<p>Brilinta (บริลินต้า)</p>	 

Ticagrelor (ทिकाกริเลอ์)

มี 2 ขนาด คือ 60 mg และ 90 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Ticagrelor 90 mg (ทिकाกริเลอ์)	Ticata (ทिकाตา)	 

Prasugrel (พราซูเกรล)

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Prasugrel 10 mg (พราซูเกรล)</p>	<p>Effient (เอฟเฟียน)</p>	

ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด (Anticoagulant Drugs)

Anticoagulant Drugs

- Parenteral

- Unfractionated heparin
- Enoxaparin (Clexane[®], Thenox[®])
- Tinzaparin (Innohep[®])
- Bemiparin (Hibor[®])
- Fondaparinux (Arixtra[®])


- Oral

- Warfarin (Maforan[®])
- Dabigatran (Pradaxa[®])
- Rivaroxaban (Xarelto[®], Rivaxored[®])
- Apixaban (Eliquis[®], Sandoz[®])
- Edoxaban (Lixiana[®])

Unfractionated heparin inj (ยาฉีดเฮพพาริน)

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Heparin 25000 IU/5 mL (เฮพพาริน)</p>	<p>Heparin LEO (เฮพพาริน ลีโอ)</p>	

Unfractionated heparin inj (ยาฉีดเฮพพาริน)

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Heparin 25000 IU/5 mL (เฮพพาริน)</p>	<p>Heparin Injection BP (เฮพพาริน บีพี)</p>	

Heparin in NSS (ยาฉีดเฮพพาริน)

มี 3 ขนาด คือ 10, 50, 100 IU/mL 5 mL

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Heparin in NSS 10 IU/mL 5mL (เฮพพาริน)	Heparin LEO (เฮพพาริน ลีโอ)	

Heparin in NSS (ยาฉีดเฮพพาริน)

มี 3 ขนาด คือ 10, 50, 100 IU/mL 5 mL

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Heparin in NSS 50 IU/mL 5mL (เฮพพาริน)</p>	<p>Heparin LEO (เฮพพาริน ลีโอ)</p>	

Heparin in NSS (ยาฉีดยาเฮพาริน)

มี 3 ขนาด คือ 10, 50, 100 IU/mL 5 mL

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Heparin in NSS 100 IU/mL 5mL (เฮพาริน)	Heparin LEO (เฮพาริน ลีโอ)	

Enoxaparin inj (ยาฉีดยานอกซาพาริน)

มี 3 ขนาด คือ 40, 60, 80 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Enoxaparin 40 mg/0.4 ml (อินอกซาพาริน)	Clexane (เคลกเซน)	

Enoxaparin inj (ยาฉีดยานอกซาพาริน)

มี 3 ขนาด คือ 40, 60, 80 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Enoxaparin 40 mg/0.4 ml (อินอกซาพาริน)	Thenox (ทีน็อก)	

Enoxaparin inj (ยาฉีดยานอกซาพาริน)

มี 3 ขนาด คือ 40, 60, 80 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Enoxaparin 60 mg/0.6 ml (อินอกซาพาริน)	Clexane (เคลกเซน)	 

Enoxaparin inj (ยาฉีดยานอกซาพาริน)

มี 3 ขนาด คือ 40, 60, 80 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Enoxaparin 60 mg/0.6 ml (อินอกซาพาริน)	Thenox (ทีน็อก)	

Enoxaparin inj (ยาฉีดยานอกซาพาริน)

มี 3 ขนาด คือ 40, 60, 80 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Enoxaparin 80 mg/0.8 ml (อินอกซาพาริน)	Clexane (เคลกเซน)	 

Enoxaparin inj (ยาฉีดยานอกซาพาริน)

มี 3 ขนาด คือ 40, 60, 80 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Enoxaparin 80 mg/0.8 ml (อินอกซาพาริน)	Thenox (ทีน็อก)	

Tinzaparin inj (ยาฉีดทिनซาพาริน)

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Tinzaparin 10,000 IU/mL 2mL (ทินซาพาริน)</p>	<p>Innohep (อินโนเฮพ)</p>	

Bemiparin inj (ยาฉีดเบมิพาริน)

มี 4 ขนาด คือ 3500, 5000, 7500, 10000 IU

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Bemiparin 3500 IU/0.2 mL (เบมิพาริน)	Hibor (ไฮเบอร์)	


Bemiparin inj (ยาฉีดเบมิพาริน)

มี 4 ขนาด คือ 3500, 5000, 7500, 10000 IU

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Bemiparin 5000 IU/0.2 mL (เบมิพาริน)	Hibor (ไฮเบอร์)	

Bemiparin inj (ยาฉีดยาเบมิพาริน)

มี 4 ขนาด คือ 3500, 5000, 7500, 10000 IU

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Bemiparin 7500 IU/0.3 mL (เบมิพาริน)	Hibor (ไฮเบอร์)	

Bemiparin inj (ยาฉีดเบมิพาริน)

มี 4 ขนาด คือ 3500, 5000, 7500, 10000 IU

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Bemiparin 10000 IU/0.4 mL (เบมิพาริน)	Hibor (ไฮเบอร์)	

Fondaparinux (PFS) inj (ยาฉีดยาฟอนดาพารินูค)

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Fondaparinux 2.5 mg/0.5 mL (ฟอนดาพารินูค)</p>	<p>Arixtra (อริคตร้า)</p>	


Warfarin (วอร์ฟาริน)

มี 3 ขนาด คือ 2, 3, 5 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Warfarin 2 mg (วอร์ฟาริน)</p>	<p>Maforan (มาฟอแรน)</p>	 

Warfarin (วอร์ฟาริน)

มี 3 ขนาด คือ 2, 3, 5 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Warfarin 3 mg (วอร์ฟาริน)</p>	<p>Maforan (มาฟอแรน)</p>	 

Warfarin (วอร์ฟาริน)

มี 3 ขนาด คือ 2, 3, 5 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Warfarin 5 mg (วอร์ฟาริน)</p>	<p>Maforan (มาฟอแรน)</p>	

Dabigatran (ดาบิกาเทรน)

มี 3 ขนาด คือ 75, 110, 150 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Dabigatran</p> <p>75 mg</p> <p>(ดาบิกาเทรน)</p>	<p>Pradaxa</p> <p>(พราดาซ่า)</p> 	 
<p>Dabigatran</p> <p>110 mg</p> <p>(ดาบิกาเทรน)</p>	<p>Pradaxa</p> <p>(พราดาซ่า)</p> 	 

Dabigatran (ดาบิกาเทรน)

มี 3 ขนาด คือ 75, 110, 150 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Dabigatran 150 mg (ดาบิกาเทรน)</p>	<p>Pradaxa (พราดาซ่า)</p>	 

Rivaroxaban (ไรวาร์อกซาแบน)

มี 4 ขนาด คือ 2.5, 10, 15, 20 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Rivaroxaban 2.5 mg (ไรวาร์อกซาแบน)	Xarelto (ซาเรลโต)	   


Rivaroxaban (โรวาร็อกซาแบน)

มี 4 ขนาด คือ 2.5, 10, 15, 20 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Rivaroxaban 10 mg (โรวาร็อกซาแบน)	Xarelto (ซาเรลโต)	  

Rivaroxaban (โรวาร็อกซาแบน)

มี 4 ขนาด คือ 2.5, 10, 15, 20 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Rivaroxaban 10 mg (โรวาร็อกซาแบน)	Rivaxored (โรวาซอเรด)	   

Rivaroxaban (ไรวาร์อกซาแบน)

มี 4 ขนาด คือ 2.5, 10, 15, 20 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Rivaroxaban 15 mg (ไรวาร์อกซาแบน)	Xarelto (ซาเรลโต้)	

Rivaroxaban (โรวาร็อกซาแบน)

มี 4 ขนาด คือ 2.5, 10, 15, 20 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Rivaroxaban 15 mg (โรวาร็อกซาแบน)	Rivaxored (โรวาซอเรด)	 

Rivaroxaban (ไรวาร์็อกซาแบน)

มี 4 ขนาด คือ 2.5, 10, 15, 20 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Rivaroxaban 20 mg (ไรวาร์็อกซาแบน)	Xarelto (ซาเรลโต)	 The image shows the physical tablets and their packaging. On the left, two individual red, circular tablets are shown next to a black ruler for scale. The top tablet has 'BAYER' and 'R' embossed on it, while the bottom one has '20' and 'V'. On the right, there are two blister packs: a silver one with 14 tablets and an orange one with 28 tablets. Below the blister packs is the white cardboard box for Xarelto 20 mg, which features the Bayer logo and the text 'Xarelto® 20 mg film-coated tablets Rivaroxaban For oral use. 28 film-coated tablets'.

Rivaroxaban (โรวาร็อกซาแบน)

มี 4 ขนาด คือ 2.5, 10, 15, 20 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Rivaroxaban 20 mg (โรวาร็อกซาแบน)</p>	<p>Rivaxored (โรวาซอเรด)</p>	 


Apixaban (อะพิซาแบน)

มี 2 ขนาด คือ 2.5, 5 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Apixaban 2.5 mg (อะพิซาแบน)</p>	<p>Eliquis (เอลลิควิส)</p>	


Apixaban (อะพิซาแบน)

มี 2 ขนาด คือ 2.5, 5 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Apixaban 2.5 mg (อะพิซาแบน)</p>	<p>Apixaban Sandoz (อะพิซาแบน แซนด์ดอส)</p>	  


Apixaban (อะพิจาแบน)

มี 2 ขนาด คือ 2.5, 5 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Apixaban 5 mg (อะพิจาแบน)</p>	<p>Eliquis (เอลลิควิส)</p>	  

Apixaban (อะพิซาแบน)

มี 2 ขนาด คือ 2.5, 5 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Apixaban 5 mg (อะพิซาแบน)	Apixaban Sandoz (อะพิซาแบน แซนด์ดอส)	  

Edoxaban (อีดีออกซาแบน)

มี 3 ขนาด คือ 15, 30, 60 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Edoxaban 15 mg (อีดีออกซาแบน)</p>	<p>Lixiana (ลิกเซียน่า)</p>	 

Edoxaban (อีดีอกซาแบน)

มี 3 ขนาด คือ 15, 30, 60 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Edoxaban 30 mg (อีดีอกซาแบน)	Lixiana (ลิกเซียน่า)	

Edoxaban (อีต็อกซาแบน)

มี 3 ขนาด คือ 15, 30, 60 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Edoxaban 60 mg (อีต็อกซาแบน)</p>	<p>Lixiana (ลิกเซียน่า)</p>	

ยาเบาหวานกลุ่ม SGLT-2 inhibitors

แนะนำให้หยุดยาเบาหวานกลุ่ม SGLT-2 inhibitors **อย่างน้อย 3 วัน**
ก่อนการผ่าตัด เนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิดเลือดเป็นกรดจากสารคีโตนโดย
ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในค่าปกติ และให้เริ่มใช้ยาอีกครั้งเมื่อผู้ป่วยเริ่ม
รับประทานอาหารได้ตามปกติหลังผ่าตัด

Canagliflozin (Invokana)

มี 2 ขนาด คือ 100, 300 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Canagliflozin 100 mg (แคนากลิโฟลซิน)</p>	<p>Invokana (อินโวคานา)</p>	  


Canagliflozin (Invokana)

มี 2 ขนาด คือ 100, 300 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Canagliflozin 300 mg (แคนากลิโฟลซิน)</p>	<p>Invokana (อินโวคานา)</p>	 

Dapagliflozin (Forxiga)

มีขนาด 10 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Dapagliflozin 10 mg (ดาพากลิโฟลซิน)</p>	<p>Forxiga (ฟอร์ซิกา)</p>	  

Empagliflozin (Jardiance)

มี 2 ขนาด คือ 10, 25 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Empagliflozin 10 mg (เอ็มแพกลีโฟลซิน)</p>	<p>Jardiance (จาร์ดีอานซ์)</p>	  

Empagliflozin (Jardiance)

มี 2 ขนาด คือ 10, 25 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Empagliflozin 25 mg (เอ็มแพกลีโฟลซิน)</p>	<p>Jardiance (จาร์ดีอานซ์)</p>	  

Luseogliflozin (Lusefi)

มี 2 ขนาด คือ 2.5, 5 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Luseogliflozin 2.5 mg (ลูซีโอกลิโฟลซิน)</p>	<p>Lusefi (ลูเซฟี)</p>	 

Luseogliflozin (Lusefi)

มี 2 ขนาด คือ 2.5, 5 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Luseogliflozin 5 mg (ลูซีโอกลิโฟลซิน)</p>	<p>Lusefi (ลูเซฟี)</p>	 

Dapagliflozin + Metformin XR (Xigduo XR)

มี 2 ขนาด คือ 5/1000, 10/1000 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Dapagliflozin + Metformin XR 5/1000 mg (ดาพากลิโฟลซิน + เมตฟอร์มิน เอ็กซ์ อาร์)	Xigduo XR (ซิกดูโอ เอ็กซ์อาร์)	 

Dapagliflozin + Metformin XR (Xigduo XR)

มี 2 ขนาด คือ 5/1000, 10/1000 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Dapagliflozin + Metformin XR 10/1000 mg (ดาพากลีโฟลซิน + เมตฟอร์มิน เอ็กซ์ อาร์)	Xigduo XR (ซิกดูโอ เอ็กซ์อาร์)	 

Empagliflozin + Metformin (Jardiance Duo)

มี 2 ขนาด คือ 5/1000, 12.5/1000 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Empagliflozin + Metformin 5/1000 mg (เอ็มแพกลีโฟลซิน + เมตฟอร์มิน)	Jardiance Duo (จาร์ติอานซ์ ดูโอ)	  

Empagliflozin + Metformin (Jardiance Duo)

มี 2 ขนาด คือ 5/1000, 12.5/1000 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Empagliflozin + Metformin 12.5/1000 mg (เอ็มแพกลีโฟลซิน + เมตฟอร์มิน)</p>	<p>Jardiance Duo (จาร์ติอานซ์ ดูโอ)</p>	  

Empagliflozin + Linagliptin (Glyxambi)

มี 2 ขนาด คือ 10/5, 25/5 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Empagliflozin + Linagliptin 10/5 mg (เอ็มแพกลีโฟลซิน + ลินากลิปทิน)</p>	<p>Glyxambi (กลีแซมบี)</p>	 

Empagliflozin + Linagliptin (Glyxambi)

มี 2 ขนาด คือ 10/5, 25/5 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Empagliflozin + Linagliptin 25/5 mg (เอ็มแพกลีโฟลซิน + ลินากลิปทิน)</p>	<p>Glyxambi (กลีแซมบี)</p>	

ยาเบาหวานกลุ่ม
**Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1)
Receptor Agonists**

Preoperative management on Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1) Receptor Agonists

- American Society of Anesthesiologists Consensus-Based Guidance on Preoperative Management of Patients (Adults and Children) on Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1) Receptor Agonists
- The GLP-1 agonists are associated with adverse gastrointestinal effects such as nausea, vomiting and delayed gastric emptying. This is most likely through rapid tachyphylaxis at the level of vagal nerve activation. Based on recent anecdotal reports, there are concerns that delayed gastric emptying from GLP-1 agonists can **increase the risk of regurgitation and pulmonary aspiration of gastric contents during general anesthesia and deep sedation**. The presence of adverse gastrointestinal symptoms (nausea, vomiting, dyspepsia, abdominal distension) in patients taking GLP-1 agonists are predictive of increased residual gastric contents.

GLP1-Receptor Agonists	Pre-op Management	Medication*
Short & Intermediate-acting	holding on the day of the procedure	<ul style="list-style-type: none"> - Liraglutide (Saxenda[®]) - Liraglutide + Insulin degludec (Xultophy[®]) - Lixisenatide+Insulin glargine (Soliqua[®])
Long-acting	holding a week prior to the procedure	<ul style="list-style-type: none"> - Dulaglutide (Trulicity[®]) - Semaglutide (Ozempic[®], Wegovy[®]) - Semaglutide tablet (Rybelsus[®]) - Tirzepatide (Mounjaro[®])

Liraglutide (Saxenda®)

Prefilled Pen 6 mg/mL, 3 mL

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Liraglutide (ลिरากลูไทด์)	Saxenda (แซคเซินดา)	 The image shows the packaging for Saxenda, a pre-filled pen. The box is white with a blue and red wave logo on the right side. Text on the box includes "Saxenda® 6 mg/ml", "Solution for injection in pre-filled pen", "Liraglutide", "Subcutaneous use", and "3 pens". Below the box, three blue pre-filled pens are shown, each with "Saxenda® 6 mg/ml injection" printed on the side.

Insulin Degludec 100IU + Liraglutide 3.6mg/mL, 3mL Pen (Xultophy®)

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Insulin Degludec + Liraglutide (อินซูลิน ดีกลูเด็ค + ลิรากลูไทด์)</p>	<p>Xultophy (เซาโทฟาย)</p>	

Insulin glargine + Lixisenatide Pen (Soliqua®)

มี 2 ขนาด คือ Insulin glargine 100U + Lixisenatide 33mcg/mL 3mL

และ Insulin glargine 100U + Lixisenatide 50mcg/mL 3mL

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Insulin glargine 100U + Lixisenatide 33mcg/mL 3mL (อินซูลิน กลาร์จีน + ลิกซิเซนาไทด์)</p>	<p>Soliqua (โซลิควา)</p>	
<p>Insulin glargine 100U + Lixisenatide 50mcg/mL 3mL (อินซูลิน กลาร์จีน + ลิกซิเซนาไทด์)</p>		


Semaglutide Prefilled Pen Inj (Ozempic®)

มี 3 ขนาด คือ 0.25 mg, 0.5 mg และ 1 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Semaglutide Prefilled Pen 0.25 mg (เซமாகลูไทด์)	Ozempic (โอเซ็มพิค)	
Semaglutide Prefilled Pen 0.5 mg (เซமாகลูไทด์)		
Semaglutide Prefilled Pen 1 mg (เซமாகลูไทด์)		



Semaglutide Tab (Rybelsus®)

มี 3 ขนาด คือ 3 mg, 7 mg และ 14 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Semaglutide 3 mg (เซมากรูไทด์)</p>	<p>Rybelsus (รีเบลซุส)</p>	   




Semaglutide Tab (Rybelsus®)

มี 3 ขนาด คือ 3 mg, 7 mg และ 14 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Semaglutide 7 mg (เซมากรลูไทด์)	Rybelsus (รีเบลซุส)	  

Semaglutide Tab (Rybelsus®)

มี 3 ขนาด คือ 3 mg, 7 mg และ 14 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Semaglutide 14 mg (เซมากรูไทด์)</p>	<p>Rybelsus (รีเบลซุส)</p>	  

Semaglutide Flextouch Inj (Wegovy®)

มี 5 ขนาด คือ 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 1.7 mg และ 2.4 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Semaglutide 0.25 mg (เซமாகลูไทด์)	Wegovy (วีโกวี)	
Semaglutide 0.5 mg (เซமாகลูไทด์)		
Semaglutide 1 mg (เซமாகลูไทด์)		

Semaglutide Flextouch Inj (Wegovy®)

มี 5 ขนาด คือ 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 1.7 mg และ 2.4 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Semaglutide 1.7 mg (เซமாகลูไทด์)	Wegovy (วีโกวี)	
Semaglutide 2.4 mg (เซமாகลูไทด์)		



Dulaglutide Inj (Trulicity® Autoinjector)

มี 2 ขนาด คือ 0.75 mg, 1.5 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
<p>Dulaglutide Inj 0.75 mg (ดูลากลูไทด์)</p>	<p>Trulicity (ทรูลิซิตี)</p>	 <p>The image shows a single 0.75 mg autoinjector pen and its packaging. The pen is white with a green cap and a yellow label that reads 'trulicity (dulaglutide) injection 0.75 mg/0.5 mL'. The packaging is white and yellow, featuring the text '4 Single-Dose Pens', 'Each pen delivers a 0.75 mg dose. Use one pen every week.', and '0.75 mg/0.5 mL once weekly'. The Lilly logo is visible at the bottom right of the box.</p>
<p>Dulaglutide Inj 1.5 mg (ดูลากลูไทด์)</p>		 <p>The image shows a single 1.5 mg autoinjector pen and its packaging. The pen is white with a green cap and a blue label that reads 'trulicity (dulaglutide) injection 1.5 mg/0.5 mL'. The packaging is white and blue, featuring the text '4 Single-Dose Pens', 'Each pen delivers a 1.5 mg dose. Use one pen every week.', and '1.5 mg/0.5 mL once weekly'. The Lilly logo is visible at the bottom right of the box.</p>


Tirzepatide Inj (Mounjaro®)

Prefilled Pen มี 4 ขนาด คือ 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Tirzepatide Inj 2.5 mg (ไทร์เซพาไทด์)	Mounjaro (มอนจาโร)	
Tirzepatide Inj 5 mg (ไทร์เซพาไทด์)		

Tirzepatide Inj (Mounjaro®)

Prefilled Pen มี 4 ขนาด คือ 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Tirzepatide Inj 7.5 mg (ไทรเซฟาไทด์)	Mounjaro (มอนจาโร)	 <p>The image shows the packaging and four pre-filled pens for Mounjaro 7.5 mg. On the left is a box labeled 'mounjaro 7.5 mg/dose KwikPen' with 'solution for injection in pre-filled pen tirzepatide subcutaneous use' and 'Once weekly 1 pen (4 doses)'. On the right, four pens are shown against a ruler, with the top pen labeled '7.5 mg/dose'.</p>
Tirzepatide Inj 10 mg (ไทรเซฟาไทด์)		 <p>The image shows the packaging and four pre-filled pens for Mounjaro 10 mg. On the left is a box labeled 'mounjaro 10 mg/dose KwikPen' with 'solution for injection in pre-filled pen tirzepatide subcutaneous use' and 'Once weekly 1 pen (4 doses)'. On the right, four pens are shown against a ruler, with the top pen labeled '10 mg/dose'.</p>