

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

ยาที่อาจต้องหยุดก่อนผ่าตัด

ภญ. วิภา ธรรมทินโน
Medication Reconciliation
Ambulatory Care, Pharmacy Department, Siriraj Hospital

Edit 19/10/2026

กลุ่มยาที่อาจต้องพิจารณางดยาก่อนการผ่าตัด

	ตัวอย่างยา	ระยะเวลาที่งดก่อนผ่าตัด	ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ANTIPLATELETS	Aspirin, Clopidogrel, Cilostazol, Ticlopidine, Ticagrelor, Prasugrel	ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์	เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกผิดปกติ
ANTICOAGULANTS	Warfarin, Dabigatran, Rivaroxaban, Apixaban, Edoxaban, Heparin, Enoxaparin, Tinzaparin, Bemiparin, Fondaparinux	ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์	เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกผิดปกติ
ยาเบาหวานกลุ่ม **SGLT-2 INHIBITORS** (ลงท้ายด้วย **GLIFLOZIN**)	Canagliflozin, Dapagliflozin, Empagliflozin, Luseogliflozin	3 วันก่อนผ่าตัด	เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดเป็นกรดจากสารคีโตน โดยระดับน้ำตาลในเลือด อยู่ในค่าปกติ
ยาเบาหวานกลุ่ม **GLP-1 RECEPTOR AGONISTS** (ลงท้ายด้วย **GLUTIDE**)*	Dulaglutide Semaglutide Semaglutide tablet	GLP-1 ที่ฉีดสัปดาห์ละครั้ง หรือ Long-acting ให้งดเช้าวันผ่าตัด	เพิ่มความเสี่ยงต่อการสำลักสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหาร ระหว่างการระงับความรู้สึกทั่วไป หรือ ภาวะมยาสลบ
	Liraglutide Liraglutide + Insulin degludec Lixisenatide + Insulin glargine	GLP-1 ที่ใช้วันละครั้ง ให้งดเช้าวันผ่าตัด	
ยาเบาหวานกลุ่ม **DUAL GIP/GLP-1 RECEPTOR AGONISTS***	Tirzepatide	GLP-1 ที่ฉีดสัปดาห์ละครั้ง หรือ Long-acting ให้งดเช้าวันผ่าตัด	
อาหารเสริม สมุนไพร	โสม ใบแปะก๊วย กระเทียม ขิง ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร วิตามินซี/ อี ขนาดสูง Coenzyme Q10	2 สัปดาห์ก่อนผ่าตัด	เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกผิดปกติ

*ประกาศ เรื่อง แนวทางการหยุดยารักษาเบาหวาน กลุ่ม GLP-1 Receptor Agonists และยา GIP/GLP-1 Receptor Agonist ก่อนการผ่าตัด (ฉบับปรับปรุง) จากที่ประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด โรงพยาบาลศิริราช ครั้งที่ 2/2569 วันที่ 19 มิถุนายน 2569

ยาที่อาจต้องหยุดก่อนผ่าตัด
(เฉพาะรายการยาที่มีจำหน่ายในโรงพยาบาลศิริราช)

ยาต้านการเกาะตัวของเกล็ดเลือด (Antiplatelet Drugs)

- Aspirin (B-Aspirin®, Asprex®, Cardiprin® ASA)
- Clopidogrel (Platogrix® , Apolets® , Clopidogrel GPO®, Clopidogrel SANDOZ®)
- Cilostazol (Pletaal® , Cilosol® , Bestazol®)
- Ticlopidine (Ticlodin®)
- Ticagrelor (Tgrelor®, Ticata®, Brilinta®)
- Prasugrel (Effient®)

ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด (Anticoagulant Drugs)

Parenteral

- Unfractionated heparin
- Enoxaparin (Clexane®, Thenox®)
- Tinzaparin (Innohep®)
- Bemiparin (Hibor®)
- Fondaparinux (Arixtra®)

Oral

- Warfarin (Maforan®)
- Dabigatran (Pradaxa®, Sandoz®)
- Rivaroxaban (Xarelto®, Rivaxored®)
- Apixaban (Eliquis®, Sandoz®, Apixan®)
- Edoxaban (Lixiana®)

ยาที่อาจต้องหยุดก่อนผ่าตัด
(เฉพาะรายการยาที่มีจำหน่ายในโรงพยาบาลศิริราช)

- ยาเบาหวานกลุ่ม SGLT-2 inhibitors

รูปแบบยา	ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	ขนาดยา
ยาเดี่ยว	Canagliflozin	Invokana	100 mg, 300 mg
	Dapagliflozin	Forxiga	10 mg
	Empagliflozin	Jardiance	10 mg, 25 mg
	Luseogliflozin	Lusefi	2.5 mg, 5 mg
ยาผสม	Canagliflozin+Metformin	Vokanamet	50/500 mg, 150/500 mg
	Dapagliflozin+Metformin	Xigduo XR	5/1000 mg, 10/1000 mg
	Empagliflozin+Metformin	Jardiance DUO	5/1000 mg, 12.5/1000 mg 5/500 mg, 12.5/500 mg
	Empagliflozin+Linagliptin	Glyxambi	10/5 mg, 25/5 mg

**ตัวอักษรสีแดงคือไม่มีจำหน่ายใน รพ.ศิริราช ข้อมูล ณ.วันที่ 15/01/2026



ยาที่อาจต้องหยุดก่อนผ่าตัด
(เฉพาะรายการยาที่มีจำหน่ายในโรงพยาบาลศิริราช)

- ยาเบาหวานกลุ่ม GLP1-Receptor Agonists

	ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	ขนาดยา
Daily dosing	Liraglutide	Saxenda	6 mg/mL
	Liraglutide+Insulin degludec	Xultophy	3.6 mg/mL/100 IU
	Lixisenatide+Insulin glargine	Soliqua	33 mcg/mL/100 IU 50 mcg/mL/100 IU
	Semaglutide	Rybelsus	3 mg, 7 mg, 14 mg
Weekly dosing	Dulaglutide	Trulicity	0.75 mg, 1.5 mg
	Semaglutide	Ozempic	0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg
		Wegovy	0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 1.7 mg, 2.4 mg
	Tirzepatide	Mounjaro	2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg

ยาต้านการเกาะตัวของเกล็ดเลือด
(Antiplatelet Drugs)

Aspirin (แอสไพริน)
มี 3 ขนาด คือ 81, 100, 300 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Aspirin 81 mg (แอสไพริน)	B-Aspirin (บี-แอสไพริน)	
Aspirin 100 mg (แอสไพริน)	Cardiprin ASA (คาร์ดิปริน เอเอสเอ)	
Aspirin 300 mg (แอสไพริน)	Asprex (แอสเพรกซ์)	

รูปภาพจาก Siriraj Drug list

Aspirin 81 mg (แอสไพริน)


ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Aspirin 81 mg (แอสไพริน)	B-Aspirin	  

Aspirin 100 mg (แอสไพริน)

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Aspirin dispersible tablet tablet 100 mg (แอสไพริน)	Cardiprin ASA ASA (คาร์ดิปริน เอเอสเอ)	 

รูปภาพจาก Siriraj Drug list


Aspirin EC 300 mg (แอสไพริน)

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Aspirin 300 mg (แอสไพริน)	Asprex (แอสเพรกซ์)	  

Clopidogrel (โคลพิโดเกรล)

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Clopidogrel 75 mg (โคลพิโดเกล)	Apolets (อะโปเลท)	  

Clopidogrel (โคลพิโดเกรล)

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Clopidogrel 75 mg (โคลพิโดเกล)	Clopidogrel GPO (โคลพิโดเกล จีพีโอ)	  


รูปภาพจาก Siriraj Drug list

Clopidogrel (โคลพิโดเกรล)

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Clopidogrel 75 mg (โคลพิโดเกล)	Platogrix (พลาโทกริก)	  

Cilostazol (ซิลอสตาซอล)

มี 2 ขนาด คือ 50 mg และ 100 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Cilostazol 50 mg (ซิลอสตาซอล)	Bestazol (เบสตาซอล)	


Cilostazol (ซิลอสตาซอล)

มี 2 ขนาด คือ 50 mg และ 100 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Cilostazol 50 mg (ซิลอสตาซอล)	Cilosol (ซิโลซอล)	   

Cilostazol (ซิลอสตาซอล)

มี 2 ขนาด คือ 50 mg และ 100 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Cilostazol 100 mg (ซิลอสตาซอล)	Cilosol (ซิโลซอล)	  

Cilostazol (ซิลอสตาซอล)

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Cilostazol 100 mg (ซิลอสตาซอล)	Pletaal SR (พลีทาล แอสอาร์)	

Cilostazol Powder

(ซิลอสตาซอล)

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Cilostazol Powder 100 mg/ sachet (ซิลอสตาซอล)	Pletaal Powder 20% (พลีทาล)	

Ticlopidine (ทิโคลพิดีน)

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Ticlopidine 250 mg (ทิโคลพิดีน)	Ticlodin (ทิโคลดิน)	  

รูปภาพจาก Siriraj Drug list

Ticagrelor (ทิคากรีเลอร์)

มี 2 ขนาด คือ 60 mg และ 90 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Ticagrelor 60 mg (ทิคากรีเลอร์)	Brilinta (บริลินต้า)	


Ticagrelor (ทิคากรีเลอร์)

มี 2 ขนาด คือ 60 mg และ 90 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Ticagrelor 60 mg (ทิคากรีเลอร์)	Tgrelor (ทิกรีลอร์)	


Ticagrelor (ทิคากรีเลอร์)

มี 2 ขนาด คือ 60 mg และ 90 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Ticagrelor 90 mg (ทิคากรีเลอร์)	Brilinta (บริลินต้า)	  

Ticagrelor (ทิคากรีเลอร์)

มี 2 ขนาด คือ 60 mg และ 90 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Ticagrelor 90 mg (ทิคากรีเลอร์)	Ticata (ทิคาตา)	  

รูปภาพจาก Siriraj Drug list

Prasugrel (พราซูเกรล)

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Prasugrel 10 mg (พราซูเกรล)	Effient (เอฟเฟี้ยน)	

ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด (Anticoagulant Drugs)


Anticoagulant Drugs

- Parenteral
  - Unfractionated heparin
  - Enoxaparin (Clexane®, Thenox®)
  - Tinzaparin (Innohep®)
  - Bemiparin (Hibor®)
  - Fondaparinux (Arixtra®)
- Oral
  - Warfarin (Maforan®)
  - Dabigatran (Pradaxa®, Sandoz®)
  - Rivaroxaban (Xarelto®, Rivaxored®)
  - Apixaban (Eliquis®, Apixan®)
  - Edoxaban (Lixiana®)

Unfractionated heparin inj (ยาฉีดเฮพพาริน)

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Heparin 25000 IU/5 mL (เฮพพาริน)	Heparin LEO (เฮพพาริน ลีโอ)	

Unfractionated heparin inj (ยาฉีดเฮพพาริน)

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Heparin 25000 IU/5 mL (เฮพพาริน)	Heparin Injection BP (เฮพพาริน บีพี)	

รูปภาพจาก Siriraj Drug list

Heparin in NSS (ยาฉีดเฮพพาริน)


มี 3 ขนาด คือ 10, 50, 100 IU/mL 5 mL

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Heparin in NSS 10 IU/mL 5mL (เฮพพาริน)	Heparin LEO (เฮพพาริน ลีโอ)	

รูปภาพจาก Siriraj Drug list

Heparin in NSS (ยาฉีดเฮพพาริน)


มี 3 ขนาด คือ 10, 50, 100 IU/mL 5 mL

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Heparin in NSS 50 IU/mL 5mL (เฮพพาริน)	Heparin LEO (เฮพพาริน ลีโอ)	

รูปภาพจาก Siriraj Drug list

Heparin in NSS (ยาฉีดเฮพพาริน)

มี 3 ขนาด คือ 10, 50, 100 IU/mL 5 mL

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Heparin in NSS 100 IU/mL 5mL (เฮพพาริน)	Heparin LEO (เฮพพาริน ลีโอ)	

Enoxaparin inj (ยาฉีดอีนอกซาพาริน)

มี 3 ขนาด คือ 40, 60, 80 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Enoxaparin 40 mg/0.4 ml (อีนอกซาพาริน)	Clexane (เคลกเซน)	

Enoxaparin inj (ยาฉีดอีนอกซาพาริน)

มี 3 ขนาด คือ 40, 60, 80 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Enoxaparin 40 mg/0.4 ml (อีนอกซาพาริน)	Thenox (ทีนอก)	

Enoxaparin inj (ยาฉีดอีนอกซาพาริน)

มี 3 ขนาด คือ 40, 60, 80 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Enoxaparin 60 mg/0.6 ml (อีนอกซาพาริน)	Clexane (เคลกเซน)	 

Enoxaparin inj (ยาฉีดอีนอกซาพาริน)

มี 3 ขนาด คือ 40, 60, 80 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Enoxaparin 60 mg/0.6 ml (อีนอกซาพาริน)	Thenox (ทีนอก)	 

Enoxaparin inj (ยาฉีดอีนอกซาพาริน)

มี 3 ขนาด คือ 40, 60, 80 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Enoxaparin 80 mg/0.8 ml (อีนอกซาพาริน)	Clexane (เคลกเซน)	

Enoxaparin inj (ยาฉีดอีนอกซาพาริน)

มี 3 ขนาด คือ 40, 60, 80 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Enoxaparin 80 mg/0.8 ml (อีนอกซาพาริน)	Thenox (ทีนอก)	

Tinzaparin inj (ยาฉีดทินซาพาริน)

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Tinzaparin 10,000 IU/mL 2mL (ทินซาพาริน)	Innohep (อินโนเฮพ)	

รูปภาพจาก Siriraj Drug list

Bemiparin inj (ยาฉีดเบมิพาริน)

มี 4 ขนาด คือ 3500, 5000, 7500, 10000 IU

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Bemiparin 3500 IU/0.2 mL (เบมิพาริน)	Hibor (ไฮเบอร์)	

Bemiparin inj (ยาฉีดเบมิพาริน)


มี 4 ขนาด คือ 3500, 5000, 7500, 10000 IU

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Bemiparin 5000 IU/0.2 mL (เบมิพาริน)	Hibor (ไฮเบอร์)	

รูปภาพจาก Siriraj Drug list

Bemiparin inj (ยาฉีดเบมิพาริน)

มี 4 ขนาด คือ 3500, 5000, 7500, 10000 IU

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Bemiparin 7500 IU/0.3 mL (เบมิพาริน)	Hibor (ไฮเบอร์)	

รูปภาพจาก Siriraj Drug list

Bemiparin inj (ยาฉีดเบมิพาริน)

มี 4 ขนาด คือ 3500, 5000, 7500, 10000 IU

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Bemiparin 10000 IU/0.4 mL (เบมิพาริน)	Hibor (ไฮเบอร์)	

Fondaparinux (PFS) inj (ยาฉีดฟอนดาพารินุค)

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Fondaparinux 2.5 mg/0.5 mL (ฟอนดาพารินุค)	Arixtra (อริคตร้า)	

รูปภาพจาก Siriraj Drug list

Warfarin (วอร์ฟาริน)
มี 3 ขนาด คือ 2, 3, 5 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Warfarin 2 mg (วอร์ฟาริน)	Maforan (มาฟอแรน)	  


Warfarin (วอร์ฟาริน)
มี 3 ขนาด คือ 2, 3, 5 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Warfarin 3 mg (วอร์ฟาริน)	Maforan (มาฟอแรน)	

Warfarin (วอร์ฟาริน)
มี 3 ขนาด คือ 2, 3, 5 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Warfarin 5 mg (วอร์ฟาริน)	Maforan (มาฟอแรน)	 

Dabigatran (ดาบิกาแทรน)
มี 3 ขนาด คือ 75, 110, 150 mg



ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Dabigatran 75 mg (ดาบิกาแทรน)	Pradaxa (พราดาซ่า) 	 
Dabigatran 110 mg (ดาบิกาแทรน)	Pradaxa (พราดาซ่า) 	 

Dabigatran (ดาบิกาแทรน)
มี 3 ขนาด คือ 75, 110, 150 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Dabigatran 150 mg (ดาบิกาแทรน)	Pradaxa (พราดาซ่า)	  

รูปภาพจาก Siriraj Drug list

Dabigatran (ดาบิกาแทรน)
มี 3 ขนาด คือ 75, 110, 150 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Dabigatran 75 mg (ดาบิกาแทรน)	Dabigatran Sandoz (ดาบิกาแทรน แซนดอส) 	
Dabigatran 110 mg (ดาบิกาแทรน)	Dabigatran Sandoz (ดาบิกาแทรน แซนดอส) 	

Dabigatran (ดาบิกาแทรน)
มี 3 ขนาด คือ 75, 110, 150 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Dabigatran 150 mg (ดาบิกาแทรน)	Dabigatran Sandoz (ดาบิกาแทรน แซนดอส)	  

รูปภาพจาก Siriraj Drug list

Rivaroxaban (ไรวาร็อกซาแบน)

มี 4 ขนาด คือ 2.5, 10, 15, 20 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Rivaroxaban 2.5 mg (ไรวาร็อกซาแบน)	Xarelto (ซาเรลโต้)	    

Rivaroxaban (ไรวาร็อกซาแบน)

มี 4 ขนาด คือ 2.5, 10, 15, 20 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Rivaroxaban 10 mg (ไรวาร็อกซาแบน)	Xarelto (ซาเรลโต้)	   

Rivaroxaban (ไรวาร็อกซาแบน)

มี 4 ขนาด คือ 2.5, 10, 15, 20 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Rivaroxaban 10 mg (ไรวาร็อกซาแบน)	Rivaxored (ไรวาซอเรด)	   

รูปภาพจาก Siriraj Drug list

Rivaroxaban (ไรวาร็อกซาแบน)

มี 4 ขนาด คือ 2.5, 10, 15, 20 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Rivaroxaban 15 mg (ไรวาร็อกซาแบน)	Xarelto (ซาเรลโต้)	

Rivaroxaban (ไรวาร็อกซาแบน)

มี 4 ขนาด คือ 2.5, 10, 15, 20 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Rivaroxaban 15 mg (ไรวาร็อกซาแบน)	Rivaxored (ไรวาซอเรด)	  

รูปภาพจาก Siriraj Drug list

Rivaroxaban (ไรวาร็อกซาแบน)

มี 4 ขนาด คือ 2.5, 10, 15, 20 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Rivaroxaban 20 mg (ไรวาร็อกซาแบน)	Xarelto (ซาเรลโต้)	

รูปภาพจาก Siriraj Drug list

Rivaroxaban (ไรวาร็อกซาแบน)


มี 4 ขนาด คือ 2.5, 10, 15, 20 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Rivaroxaban 20 mg (ไรวาร็อกซาแบน)	Rivaxored (ไรวาซอเรด)	  

รูปภาพจาก Siriraj Drug list

Apixaban (อะพิซาแบน)

มี 2 ขนาด คือ 2.5, 5 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Apixaban 2.5 mg (อะพิซาแบน)	Eliquis (เอลลิควิส)	  

Apixaban (อะพิซาแบน)

มี 2 ขนาด คือ 2.5, 5 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Apixaban 2.5 mg (อะพิซาแบน)	Apixaban Sandoz (อะพิซาแบน แซนดอส)	

รูปภาพจาก Siriraj Drug list

Apixaban (อะพิซาแบน)
มี 2 ขนาด คือ 2.5, 5 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Apixaban 5 mg (อะพิซาแบน)	Eliquis (เอลลิควิส)	  

รูปภาพจาก Siriraj Drug list

Apixaban (อะพิซาแบน)

มี 2 ขนาด คือ 2.5, 5 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Apixaban 5 mg (อะพิซาแบน)	Apixan (อะพิแซน)	

Edoxaban (อีด็อกซาแบน)

มี 3 ขนาด คือ 15, 30, 60 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Edoxaban 15 mg (อีด็อกซาแบน)	Lixiana (ลิกเซียน่า)	   

Edoxaban (อีด็อกซาแบน)

มี 3 ขนาด คือ 15, 30, 60 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Edoxaban 30 mg (อีด็อกซาแบน)	Lixiana (ลิกเซียน่า)	   

Edoxaban (อีด็อกซาแบน)

มี 3 ขนาด คือ 15, 30, 60 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Edoxaban 60 mg (อีด็อกซาแบน)	Lixiana (ลิกเซียน่า)	   

รูปภาพจาก Siriraj Drug list

ยาเบาหวานกลุ่ม SGLT-2 inhibitors

แนะนำให้หยุดยาเบาหวานกลุ่ม SGLT-2 inhibitors อย่างน้อย 3 วัน ก่อนการผ่าตัด เนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิดเลือดเป็นกรดจากสารคีโตนโดย ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในค่าปกติ และให้เริ่มใช้ยาอีกครั้งเมื่อผู้ป่วยเริ่ม รับประทานอาหารได้ตามปกติหลังผ่าตัด


Canagliflozin (Invokana)

มี 2 ขนาด คือ 100, 300 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Canagliflozin 100 mg (แคนากลิโฟลซิน)	Invokana (อินโวคานา)	

Canagliflozin (Invokana)

มี 2 ขนาด คือ 100, 300 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Canagliflozin 300 mg (แคนากลิโฟลซิน)	Invokana (อินโวคานา)	  

Dapagliflozin (Forxiga)
มีขนาด 10 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Dapagliflozin 10 mg (ดาพากลิโฟลซิน)	Forxiga (ฟอร์ซิกา)	  

Empagliflozin (Jardiance)

มี 2 ขนาด คือ 10, 25 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Empagliflozin 10 mg (เอ็มแพกลิโฟลซิน)	Jardiance (จาร์ดิอานซ์)	  


Empagliflozin (Jardiance)

มี 2 ขนาด คือ 10, 25 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Empagliflozin 25 mg (เอ็มแพกลิโฟลซิน)	Jardiance (จาร์ดิอานซ์)	  


Luseogliflozin (Lusefi)

มี 2 ขนาด คือ 2.5, 5 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Luseogliflozin 2.5 mg (ลูซีโอกลิโฟลซิน)	Lusefi (ลูเซฟี)	  

Luseogliflozin (Lusefi)

มี 2 ขนาด คือ 2.5, 5 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Luseogliflozin 5 mg (ลูซีโอกลิโฟลซิน)	Lusefi (ลูเซฟี)	  

Dapagliflozin + Metformin XR (Xigduo XR)

มี 2 ขนาด คือ 5/1000, 10/1000 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Dapagliflozin + Metformin XR 5/1000 mg (ดาพากลิโฟลซิน + เมตฟอร์มิน เอ็กซ์อาร์)	Xigduo XR (ซิกดูโอ เอ็กซ์อาร์)	  

Dapagliflozin + Metformin XR (Xigduo XR)

มี 2 ขนาด คือ 5/1000, 10/1000 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Dapagliflozin + Metformin XR 10/1000 mg (ดาพากลิโฟลซิน + เมตฟอร์มิน เอ็กซ์อาร์)	Xigduo XR (ซิกดูโอ เอ็กซ์อาร์)	  

Empagliflozin + Metformin (Jardiance Duo)

มี 2 ขนาด คือ 5/1000, 12.5/1000 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Empagliflozin + Metformin 5/1000 mg (เอ็มแพกลิโฟลซิน + เมตฟอร์มิน)	Jardiance Duo (จาร์ดิอานซ์ ดูโอ)	  

Empagliflozin + Metformin (Jardiance Duo)

มี 2 ขนาด คือ 5/1000, 12.5/1000 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Empagliflozin + Metformin 12.5/1000 mg (เอ็มแพกลิโฟลซิน + เมตฟอร์มิน)	Jardiance Duo (จาร์ดิอานซ์ ดูโอ)	  

Empagliflozin + Linagliptin (Glyxambi)

มี 2 ขนาด คือ 10/5, 25/5 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Empagliflozin + Linagliptin 10/5 mg (เอ็มแพกลิโฟลซิน + ลินากลิปทิน)	Glyxambi (กลีแซมบี)	  

Empagliflozin + Linagliptin (Glyxambi)

มี 2 ขนาด คือ 10/5, 25/5 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Empagliflozin + Linagliptin 25/5 mg (เอ็มแพกลิโฟลซิน + ลินากลิปทิน)	Glyxambi (กลีแซมบี)	 

ยาเบาหวานกลุ่ม

Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1)

Receptor Agonists

แนวทางการหยุดยารักษาเบาหวานกลุ่ม GLP-1 Receptor agonist และ GIP/GLP-1 Receptor Agonist ก่อนการผ่าตัด

Update : มติคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด โรงพยาบาลศิริราช ในการประชุมครั้งที่ 2/2569 วันที่ 19 มิถุนายน 2569

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

มุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์ปรับเปลี่ยนชนิดอาหาร (Dietary modification) แทนการหยุดยาก่อนการระงับความรู้สึก

เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยควบคู่ไปกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่มีประสิทธิภาพ

การปรับเปลี่ยนอาหารในช่วง 24 ชม. ก่อนผ่าตัด

งดอาหารแข็ง ข้าว ก๋วยเตี๋ยว ขนมปัง เนื้อสัตว์ อาหารปั่น โยเกิร์ต และนมทุกชนิด



ระยะเวลาก่อนผ่าตัด

24 ชม. ดื่มได้เฉพาะเครื่องดื่มใส (Clear liquid diet)



สามารถดื่ม
- Si-carb
- น้ำหวานใส
- น้ำผลไม้ที่ไม่มีกาก
- น้ำเปล่า
- ชาและกาแฟ ไม่ใส่นม

8 ชม.



สามารถดื่มได้เพียง
- น้ำเปล่า
- ชาและกาแฟ ไม่ใส่นม และไม่ใส่น้ำตาล

4 ชม.

งดน้ำและอาหารทุกชนิดอย่างเคร่งครัด



วันผ่าตัด

Nothing by Mouth

NPO

เพื่อเตรียมพร้อมผ่าตัดอย่างปลอดภัย

การบริหารจัดการยาและประเภทการผ่าตัด

ผ่าตัดแบบนัดหมาย (Elective Surgery)



ให้หยุดยากลุ่มนี้ใน "มื้อเช้าของวันผ่าตัด"

ชื่อยาสามัญ (Generic Name)	ชื่อทางการค้า
Lixisenatide + Insulin Glargine	Soliqua®
Liraglutide	Saxenda®
Liraglutide + Insulin Degludec	Xultophy®
Dulaglutide	Trulicity®
Semaglutide	Rybelsus® (oral) Ozempic®, Wegovy®
Tirzepatide	Mounjaro®

ผ่าตัดฉุกเฉิน (Emergency Surgery)



ไม่ต้องเลื่อนการผ่าตัด ให้ทีมแพทย์ระวังภาวะอาหารค้างในกระเพาะ (Full stomach) และป้องกันการสำลักเข้าปอดอย่างเคร่งครัด

การส่งต่อผู้ป่วย

หากผู้ป่วยมีอาการทางระบบทางเดินอาหารรุนแรง (คลื่นไส้/อาเจียน) หรืออยู่ในช่วงปรับขนาดยา แนะนำส่งต่อผู้ป่วยให้แพทย์ เพื่อปรับแผนการใช้ยา และโภชนาการก่อนรับบริการทางวิสัญญี



การเริ่มใช้ยาหลังผ่าตัด



สามารถเริ่มใช้ยาได้อีกครั้ง เมื่อผู้ป่วยมีอาการคงที่ และสามารถรับประทานอาหารทางปากได้ตามปกติ

SCAN ME



Liraglutide (Saxenda®)

Prefilled Pen 6 mg/mL, 3 mL

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Liraglutide (ลิรากลูไทด์)	Saxenda (แซคเซ็นดา)	

Insulin Degludec 100IU + Liraglutide 3.6mg/mL, 3mL Pen (Xultophy®)

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Insulin Degludec + Liraglutide (อินซูลิน ดีกลูเด็ค + ลิรากลูไทด์)	Xultophy (เซาโทฟาย)	

รูปภาพจาก Siriraj Drug list

Insulin glargine + Lixisenatide Pen (Soliqua®)

มี 2 ขนาด คือ Insulin glargine 100U + Lixisenatide 33mcg/mL 3mL

และ Insulin glargine 100U + Lixisenatide 50mcg/mL 3mL

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Insulin glargine 100U + Lixisenatide 33mcg/mL 3mL (อินซูลิน กลาร์จีน + ลิกซิเซนาไทด์)	Soliqua (โซลิควา)	
Insulin glargine 100U + Lixisenatide 50mcg/mL 3mL (อินซูลิน กลาร์จีน + ลิกซิเซนาไทด์)		

Medication Reconciliation Team,
Pharmacy Department, Siriraj Hospital

รูปภาพจาก Siriraj Drug list

Semaglutide Prefilled Pen Inj (Ozempic®)

มี 3 ขนาด คือ 0.25 mg, 0.5 mg และ 1 mg


ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Semaglutide Prefilled Pen 0.25 mg (เซมากลูไทด์)	Ozempic (โอเซ็มพิค)	
Semaglutide Prefilled Pen 0.5 mg (เซมากลูไทด์)		
Semaglutide Prefilled Pen 1 mg (เซมากลูไทด์)		

Medication Reconciliation Team,
Pharmacy Department, Siriraj Hospital

รูปภาพจาก Siriraj Drug list

Semaglutide Tab (Rybelsus®)

มี 3 ขนาด คือ 3 mg, 7 mg และ 14 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Semaglutide 3 mg (เซมากลูไทด์)	Rybelsus (รีเบลซุส)	  

รูปภาพจาก Siriraj Drug list

Semaglutide Tab (Rybelsus®)

มี 3 ขนาด คือ 3 mg, 7 mg และ 14 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Semaglutide 7 mg (เซมากลูไทด์)	Rybelsus (รีเบลซุส)	 

รูปภาพจาก Siriraj Drug list

Semaglutide Tab (Rybelsus®)



มี 3 ขนาด คือ 3 mg, 7 mg และ 14 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Semaglutide 14 mg (เซมากลูไทด์)	Rybelsus (รีเบลซุส)	 

รูปภาพจาก Siriraj Drug list

Semaglutide Flextouch Inj (Wegovy®)

มี 5 ขนาด คือ 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 1.7 mg และ 2.4 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Semaglutide 0.25 mg (เซมากลูไทด์)	Wegovy (วีโกวี)	 
Semaglutide 0.5 mg (เซมากลูไทด์)		 
Semaglutide 1 mg (เซมากลูไทด์)		 

Medication Reconciliation Team,
Pharmacy Department, Siriraj Hospital

รูปภาพจาก Siriraj Drug list

Semaglutide Flextouch Inj (Wegovy®)

มี 5 ขนาด คือ 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 1.7 mg และ 2.4 mg

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Semaglutide 1.7 mg (เซมากลูไทด์)	Wegovy (วีโกวี)	
Semaglutide 2.4 mg (เซมากลูไทด์)		

รูปภาพจาก Siriraj Drug list

Dulaglutide Inj (Trulicity® Autoinjector)

มี 2 ขนาด คือ 0.75 mg, 1.5 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Dulaglutide Inj 0.75 mg (ดูลากลูไทด์)	Trulicity (ทรูลิซิตี้)	 
Dulaglutide Inj 1.5 mg (ดูลากลูไทด์)		 

รูปภาพจาก Siriraj Drug list

Tirzepatide Inj (Mounjaro®)


Prefilled Pen มี 4 ขนาด คือ 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Tirzepatide Inj 2.5 mg (ไทร์เซพาไทด์)	Mounjaro (มอนจาโร)	 
Tirzepatide Inj 5 mg (ไทร์เซพาไทด์)		 

รูปภาพจาก Siriraj Drug list

Tirzepatide Inj (Mounjaro®)

Prefilled Pen มี 4 ขนาด คือ 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 10 mg

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	รูปภาพ
Tirzepatide Inj 7.5 mg (ไทร์เซพาไทด์)	Mounjaro (มอนจาโร)	 
Tirzepatide Inj 10 mg (ไทร์เซพาไทด์)		 

รูปภาพจาก Siriraj Drug list



การจัดการยาอื่นๆ ในระหว่างการผ่าตัด แบ่งตามระบบโรคที่พบได้บ่อย

กลุ่มยา	วันผ่าตัด	ระหว่างผ่าตัด	หลังผ่าตัด
กลุ่มยาความดัน			
ยากลุ่ม ACE inhibitors (ลงท้ายด้วย –pril เช่น Enalapril) ยากลุ่ม ARBs (ลงท้ายด้วย –artan เช่น Losartan) ยาขับปัสสาวะ (เช่น HCTZ, Furosemide, Spironolactone)	**งดใช้ยา** เช้าวันผ่าตัด	ใช้ยาฉีดถ้าจำเป็น	ใช้ยาฉีด และเริ่มใช้ยากินต่อเมื่อกินได้ปกติ
ยากลุ่ม Beta-blockers (ลงท้ายด้วย –olol เช่น Atenolol, Carvedilol) ยากลุ่ม Calcium channel blockers (ลงท้ายด้วย -ipine เช่น Amlodipine) ยากลุ่ม Alpha-blockers (ลงท้ายด้วย -ocin เช่น Doxazocin, Alfuzosin, Tamsulosin)	ใช้ต่อได้ ในเช้าวันผ่าตัด	ใช้ยาฉีดถ้าจำเป็น	ใช้ยาฉีด และเริ่มใช้ยากินต่อเมื่อกินได้ปกติ
กลุ่มยาเบาหวาน และไทรอยด์			
Oral hypoglycemic ได้แก่ Sulfonylureas (เช่น glipizide, gliclazide, glimepiride) Biguanides (metformin) Thiazolidinediones (pioglitazone)	**งดใช้ยา** เช้าวันผ่าตัด	Insulin (SC หรือ IV)	ใช้ Insulin และเริ่มใช้ยากินต่อเมื่อกินได้ปกติ
Insulin			ใช้ขนาดปกติ
Thyroxine	ใช้ต่อได้ ในเช้าวันผ่าตัด		เริ่มใช้ต่อเมื่อกินได้ปกติ

สแกนเพื่อประเมินความพึงพอใจ

Reference

1. 2024. American College of Cardiology/American Heart Association. 2024 AHA/ACC/ACS/ASNC/HRS/SCA/SCCT/SCMR/SVM guideline for perioperative cardiovascular management for noncardiac surgery: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines
2. Kindel TL, Wang AY, Wadhwa A, Schulman AR, Sharaiha RZ, Kroh M, Ghanem OM, Levy S, Joshi GP, LaMasters TL; American Gastroenterological Association; American Society for Metabolic and Bariatric Surgery; American Society of Anesthesiologists; International Society of Perioperative Care of Patients with Obesity; Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons. Multisociety Clinical Practice Guidance for the Safe Use of Glucagon-like Peptide-1 Receptor Agonists in the Perioperative Period. Clin Gastroenterol Hepatol. 2025 Nov;23(12):2083-2085.
3. 2022. American College of Chest Physicians. Perioperative management of antithrombotic therapy: an American College of Chest Physicians clinical practice guideline
4. 2017. American Society of Anesthesiologists. Practice guidelines for preoperative fasting and the use of pharmacologic agents to reduce the risk of pulmonary aspiration: application to healthy patients undergoing elective procedures: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Preoperative Fasting and the Use of Pharmacologic Agents to Reduce the Risk of Pulmonary Aspiration