

Antiplatelets ที่มีใน รพ.ศิริราช

รายการยาต้านเกล็ดเลือดใน รพ.ศิริราช มีทั้งรูปแบบยา
รับประทาน และยาฉีด ดังนี้

ตารางที่ 1 Antiplatelets รูปแบบยารับประทาน

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า/ความแรง	บัญชียา	ราคา (บาท)
Aspirin	Cardiprin [®] 100 mg	NED	2.50
	B-aspirin [®] 81 mg	ก	0.50
	Ascot [®] 300 mg	ก	1
	Aprex [®] 300 mg	ก	1
Cilostazol	Pletaal [®] powder 20 %	NED	41
	Pletaal [®] 50 mg	NED	26
	Pletaal [®] 100 mg	NED	45
	Citazol [®] 50 mg	NED	12
Clopidogrel	Plavix [®] tab 300 mg	ง	345
	Apolets [®] tab 75 mg	ง	25
	Plavix [®] tab 75 mg	ง	88
	Clopidogrel-GPO [®] tab 75 mg	ง	2
	Clopidogrel - SANDOZ [®] tab 75 mg	ง	10.50
Clopidogrel and Aspirin	Coplavix [®] Tab 75/75 mg	NED	83.50

Dipyridamole	Agremol [®] cap 75 mg	NED	5.25
Dipyridamole and Aspirin	Aggrenox [®] cap 200/25 mg	NED	31
Prasugrel**	Effient [®] tab 10 mg	NED	97.50
Ticagrelor**	Brilinta [®] tab 90 mg	NED	57.50
Ticlopidine	Ticlodin [®] tab 250 mg	ง	2.75

หมายเหตุ

* เป็นยาที่จำกัดรายชื่อแพทย์และใช้แบบฟอร์มในการสั่งยา

** เป็นยาที่จำกัดรายชื่อแพทย์

ตารางที่ 2 Antiplatelets รูปแบบยาฉีด

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า	บัญชียา	ราคา (บาท)
Eptifibatide	Integrilin [®] inj 2 mg/mL 10 mL	ง	3,271
	Integrilin [®] inj 0.75 mg/mL 100 mL	ง	9,801

สอบถามข้อมูลยาและพิษวิทยา โทร 9-7007

สอบถาม Medication Reconciliation (MR) โทร 9-6964

สอบถามเรื่องแพ้ยา และประวัติการแพ้ยา โทร 9-9555



มีอะไรในฉบับนี้

- ❖ U.S. FDA ปรับปรุงคำเตือนในเอกสารกำกับยา varenicline (Champix)
- ❖ Anticoagulants ที่มีใน รพ.ศิริราช
- ❖ Antiplatelets ที่มีใน รพ.ศิริราช

ปีที่ 14 ฉบับที่ 6
เดือนมีนาคม 2558

U.S. FDA ปรับปรุงคำเตือน

ในเอกสารกำกับยา varenicline

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration) เพิ่มคำเตือนเกี่ยวกับการใช้ยา varenicline (Champix) ซึ่งเป็นยาช่วยถอนบุหรี่ ดังนี้

- ยา varenicline มีอันตรกิริยากับแอลกอฮอล์ พบว่าผู้ป่วยที่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในระหว่างที่รับประทานยานี้จะมีการทนต่อแอลกอฮอล์ลดลง

- ผู้ป่วยที่รับประทานยา varenicline มีรายงานการเกิดอาการชัก (seizure) ได้ หากผู้ป่วยเกิดอาการชักระหว่างที่ใช้ยานี้ควรหยุดยา และรีบมาพบแพทย์

- เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดอาการผิดปกติของระบบจิตประสาท (neuropsychiatric side effects) ได้แก่ ความผิดปกติของอารมณ์ พฤติกรรม และความคิด

เอกสารอ้างอิง

U.S. Food and Drug Administration. FDA DrugSafety

Communication: FDA updates label for stop smoking drug

Chantix (varenicline) to include potential alcohol interaction,

rare risk of seizures, and studies of side effects on mood,

behavior, or thinking. (9/MAR/2015).(Online).(Accessed

20/MAR/2015). Available from:

<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm436494.htm>

Anticoagulants ที่มีใน รพ.ศิริราช

รายการยาต้านการแข็งตัวของเลือดใน รพ.ศิริราช มีทั้งรูปแบบยารับประทาน และยาฉีด ดังนั้นเพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา จึงรวบรวมรายการยาดังกล่าวไว้ในตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1 Anticoagulants รูปแบบยารับประทาน

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า / ความแรง	บัญชียา	ราคา (บาท)
Apixaban*	Eliquis® tab 2.5 mg	NED	65
	Eliquis® tab 5 mg	NED	65
Dabigatran*	Pradaxa® cap 75 mg	NED	68.50
	Pradaxa® cap 110 mg	NED	68.50
	Pradaxa® cap 150 mg	NED	68.50
Rivaroxaban*	Xarelto® tab 10 mg	NED	120
	Xarelto® tab 15 mg	NED	120
	Xarelto® tab 20 mg	NED	120
Warfarin	Maforan® tab 2 mg	ค	2.25
	Orfarin® tab 3 mg	ค	5.25
	Orfarin® tab 5 mg	ค	5.50

หมายเหตุ * เป็นยาที่จำกัดชื่อแพทย์และต้องใช้แบบฟอร์มในการสั่งยา

** เป็นยาที่จำกัดชื่อแพทย์

ตารางที่ 2 Anticoagulants รูปแบบยาฉีด

ชื่อสามัญ	ชื่อการค้า / ความแรง	บัญชียา	ราคา (บาท)
Enoxaparin	Clexane® inj 40 mg/0.4 mL (PFS)	ค	241
	Clexane® inj 60 mg/0.6 mL (PFS)	ค	289
	Clexane® inj 80 mg/0.8 mL (PFS)	ค	432
Fondaparinux	Arixtra® inj 2.5 mg/0.5 mL (PFS)	ง	251
Heparin	Heparin® in NSS inj 50 IU/mL 5 mL (PFS)	ค	30
	Heparin® in NSS inj 100 IU/mL 5 mL (PFS)	ค	30
	Heparin® LEO inj 25,000 IU/5 mL	ค	225
Tinzaparin**	Innohep® inj 20,000 IU/mL 0.5 mL (PFS)	NED	485
	Innohep® inj 20,000 IU/mL 0.7 mL (PFS)	NED	565
	Innohep® inj 2 mL (10,000 anti-Xa IU)	NED	1,045
Trisodium citrate	Tri-sodium citrate® inj 30% 20 mL	hosp	40