

Hydroxyzine กับ ความผิดปกติของ EKG

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แจ้ง
ข้อมูลความปลอดภัยของยา hydroxyzine กับการเกิด
ภาวะความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิด QT
interval prolongation และ Torsade de pointes ซึ่ง
เป็นผลจากผลการทบทวนข้อมูลความปลอดภัยของ
สหภาพยุโรป ที่พบว่าความเสี่ยงดังกล่าวมีความสัมพันธ์
กับการใช้ยา hydroxyzine อย่างชัดเจน ไม่มีความ
แตกต่างกันในแต่ละข้อบ่งใช้ โดยแนะนำให้ใช้ยาใน
ขนาดต่ำที่ให้ผลการรักษาและใช้ในระยะเวลาสั้น
ห้ามใช้ยาในผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะ หัวใจเต้นผิดจังหวะ (heart rhythm
disturbances) หรือใช้ร่วมกับยาอื่นที่เพิ่มความเสี่ยง
ต่อการเกิด QT interval prolongation
ขนาดยาที่แนะนำให้ใช้คือ
ผู้ใหญ่ ไม่ควรเกิน 100 มิลลิกรัมต่อวัน
ผู้สูงอายุไม่ควรเกิน 50 มิลลิกรัมต่อวัน

เอกสารอ้างอิง

จดหมายข่าว HPVC Safety News. ศูนย์เฝ้าระวังความ
ปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองแผนงานและวิชาการ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ฉบับที่ 4/2558 มิถุนายน
2558

ibuprofen ขนาดสูงเพิ่มความเสี่ยง ต่อโรคหัวใจ และ stroke

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 องค์การ Health
Canada แจ้งเตือนโดยมีสาระสำคัญให้ระมัดระวังการใช้
ยา ibuprofen ในขนาดสูงเกิน 2,400 mg/day เนื่องจาก
พบว่าการใช้ยา ibuprofen ขนาดสูงตั้งแต่ 2,400
mg/day ขึ้นไปจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดความ
ผิดปกติของหัวใจอย่างรุนแรง และ stroke
นอกจากนี้ในผู้ป่วย ischemic heart disease,
cerebrovascular disease และ congenital heart
disease ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาในขนาดสูง

สำหรับการใช้ยา ibuprofen ในขนาดปกติ คือ
ขนาดยาไม่เกิน 1,200 mg/day ติดต่อกันไม่เกิน 7
วัน พบว่าไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
และ stroke

สำหรับรายการยา ibuprofen ที่มีใน
โรงพยาบาลศิริราช มีรายการดังนี้

- Ibuprofen tab. ขนาด 200 mg และ 400 mg
- Ibuprofen รูปแบบยาน้ำความแรง 100 mg/5 mL

เอกสารอ้างอิง

Health Canada. Summary Safety Review - Prescription
Oral Ibuprofen (Non-steroidal anti-inflammatory drug) -
Risk of serious heart and stroke adverse events at high
doses. (23/04/2015). Accessed 27/07/2015. Available
from: [http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/reviews-
examens/ibuprof-eng.php](http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/reviews-examens/ibuprof-eng.php)

รายการยาที่ใช้ NSS เท่านั้น ในการเจ็องยา

รายการยา	เหตุผล
Ampicillin inj	ยาไม่คงตัวในสารละลายที่มี dextrose
Caspofungin inj (Cancidas [®])	ยาไม่คงตัวในสารละลายที่มี dextrose
Ertapenem inj (Invanz [®])	ยาไม่คงตัวในสารละลายที่มี dextrose
Hydralazine inj (Apresoline [®])	ยาไม่คงตัวในสารละลายที่มี dextrose
Phenytoin inj (Dilantin [®])	ถ้าเจ็องด้วยสารละลายที่มี dextrose ยาทกตะกอนได้

รายการยาที่ใช้ D5W เท่านั้น ในการเจ็องยา

รายการยา	เหตุผล
Amphotericin B inj	สารน้ำที่มี sodium เป็น องค์ประกอบจะทำให้ยาทกตะกอน
Norepinephrine inj	สารน้ำที่มี dextrose ป้องกันการ oxidation ของตัวยา (สามารถใช้ D5S ได้ด้วย)



แนะนำโปรแกรมการสืบค้น ประวัติยาของผู้ป่วย (UR - Ward)

บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องการสืบค้น ประวัติการ
ใช้ยาของผู้ป่วยที่เคยได้รับจากโรงพยาบาลศิริราช
สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากโปรแกรม UR - Ward
ซึ่งติดตั้งไว้ในทุกหอผู้ป่วย



การ log in เข้าสู่ระบบ

ใช้รหัสหออผู้ป่วย: ตัวเลข 3 หลัก (รหัสเดียวกับที่เข้า
โปรแกรม Éclair)

สามารถสืบค้นข้อมูลรายการยาจาก 2 แถบเมนู คือ

วันที่จ่ายยา.....

- 03/05/2558 (อ.พพ.ประสิทธิ์ สัก)
- 09/04/2558 (นพ.สาธิต เจจนวดี)
- 05/02/2558 (นพ.สาธิต เจจนวดี)
- 11/12/2557 (นพ.สาธิต เจจนวดี)
- 30/11/2557 (อ.พพ.ประสิทธิ์ สัก)
- 29/11/2557 (อ.พพ.สุพจน์ บุญย)
- 06/11/2557 (นพ.สาธิต เจจนวดี)

1. ประวัติการใช้ยาผู้ป่วย

- ข้อมูลจะเรียงตามวันที่รับยา
ล่าสุด (ชื่อแพทย์ผู้สั่งยา)
- เลือกวันที่ต้องการ และกด
ปุ่มแสดงรายการยา จะแสดง
รายการยาทั้งหมดที่ผู้ป่วย
ได้รับจากแพทย์ท่านนั้น

- 1) An....
 - 56064106
- 2) OPD/คลินิก...
 - คลินิกผู้สูงอายุจิตเวช
 - 11/09/2556
 - 14/05/2556
 - 19/03/2556
 - 02/01/2556
 - คลินิก 17 ตึกผู้ป่วยนอก
 - 19/02/2556
 - แพทย์เวร (14)
 - 18/02/2556
 - 16/02/2556
 - จักษุ (ทั่วไป)(08)ตึกผู้
 - 18/09/2556
 - ฉายารศาสตร์ห้อง 210 ((
 - 18/07/2556
 - 15/03/2556

2. ข้อมูล MR form เลือกปุ่ม บันทึกข้อมูล MR Form

ข้อมูล จะมีทั้ง ส่วนของ IPD
และ OPD ดังนี้

1. AN : แสดงข้อมูลรายการยา
ทั้งหมดของแต่ละครั้งที่ผู้ป่วย
เข้ารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาล แยกตาม AN

2. OPD : แสดงข้อมูลแยกตาม
คลินิกที่ผู้ป่วยมาโรงพยาบาล
โดยแสดงเรียงตามวันที่

สามารถเลือกวันที่ต้องการทราบข้อมูล และกดปุ่มแสดง
รายการยา จะแสดงรายการยาที่ผู้ป่วยได้รับ

ดังนั้น โปรแกรม UR - Ward จึงเป็นตัวช่วยในการ
สืบค้นรายการย้อนหลังของผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราช

สอบถามข้อมูลยาและพิษวิทยา โทร 9 - 7007
ปรึกษา Medication Reconciliation (MR) โทร 9 - 6964
แจ้งเรื่องแพ้ยา และถามประวัติการแพ้ยา โทร 9 - 9555



มีอะไรในฉบับนี้

- ❖ Hydroxyzine กับ
ความผิดปกติของ EKG
- ❖ ibuprofen ขนาดสูงเพิ่มความเสียง
ต่อการเกิดโรคหัวใจ และ stroke
- ❖ รายการยาที่ใช้ NSS เท่านั้นในการ
เจือจางยา
- ❖ รายการยาที่ใช้ D5W เท่านั้นในการ
เจือจางยา
- ❖ แนะนำโปรแกรมการสืบค้นประวัติ
ยาของผู้ป่วย (UR - Ward)

ปีที่ 14 ฉบับที่ 10
เดือนกรกฎาคม 2558