

อุปกรณ์ล้างจมูก ที่มีในรพ.ศิริราช

เนื่องจากในปัจจุบันมีอุปกรณ์ล้างจมูกหลายรูปแบบในรพ.ศิริราช ศิริราชเภสัชศาสตร์ฉบับนี้จึงขอแนะนำอุปกรณ์ล้างจมูกรูปแบบต่างๆ พร้อมรหัส SAP และราคา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

<p>รายการที่ 1</p> 
Nasic Cleanse 100 mL
รหัส SAP : 30050015
ราคา 112 บาท

<p>รายการที่ 2</p> 
Nasic Cleanse 250 mL
รหัส SAP : 30050016
ราคา 124 บาท

<p>รายการที่ 3</p> 
Hashi Rinser Bottle 180 mL
รหัส SAP : 30050017
ราคา 112 บาท

<p>รายการที่ 4</p> 
Klean & Kare Nasal Adaptor 2's (บรรจุ 2 ชิ้น)
รหัส SAP : 30050033
ราคา 31 บาท

<p>รายการที่ 5</p> 
Cleanoze Set 250 mL (พร้อมผง NaCl 0.99 g/ซอง จำนวน 5 ซอง)
รหัส SAP : 20010509
ราคา 94 บาท

หมายเหตุ

* รายการที่ 1-4 ขึ้นทะเบียนเป็นอุปกรณ์การแพทย์ จึงไม่มีอยู่ในโปรแกรมสืบค้นรายการยาโรงพยาบาลศิริราช (Siriraj Drug List)

** รายการที่ 5 ขึ้นทะเบียนเป็นยา จึงมีอยู่ในโปรแกรมสืบค้นรายการยาโรงพยาบาลศิริราช (Siriraj Drug List)

การบริหารยาฉีด Ivemend®



รูปแบบยา (Dosage form): ใน 1 vial ประกอบด้วยผงยาปราศจากเชื้อ Ivemend® 150 mg (มี fosaprepitant dimeglumine 245.3 mg ซึ่งเทียบเท่ากับ fosaprepitant free acid 150 mg)

ข้อบ่งใช้ (Indication): ใช้สำหรับป้องกันการเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนจากการได้รับยาเคมีบำบัด

การละลายผงยา (Reconstitution): ละลายผงยา Ivemend® 150 mg ใน vial ด้วย NSS 5 mL หมุนขวดยาเบา ๆ เพื่อลดการเกิดฟอง

การเจือจางก่อนการบริหาร (Dilution for administration): นำสารละลายที่ได้หลังการละลายผงยา มาเจือจางต่อด้วย NSS 145 mL จะได้สารละลายทั้งหมด 150 mL และความเข้มข้นของยา 1 mg/mL

ความคงตัวหลังการเจือจางยา (Stability after dilution): สารละลายยาที่ได้นี้ เก็บได้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง ($\leq 25^{\circ}\text{C}$) ควรตรวจสอบว่าสารละลายยาไม่มีผงตะกอนและไม่เปลี่ยนสีก่อนนำไปใช้

การบริหารยา (Route of administration): หยดเข้าหลอดเลือดดำเป็นเวลามากกว่า 20 – 30 นาที
เอกสารอ้างอิง

Product information: Ivemend®, fosaprepitant, MSD, Thailand.

Cefspan® powder for oral suspension ผสมอย่างไร?



Cefspan® ชนิดผงสำหรับเตรียมยาน้ำแขวนตะกอนชนิดรับประทาน ด้วยยาสำคัญ คือ Cefixime (100 mg / 5 mL)

วิธีการผสม: เคาะหรือเขย่าขวดยาให้ผงยา รวน ไม่จับตัวเป็นก้อน จากนั้นใช้ถ้วยตวงที่ให้มาในกล่องตวงน้ำสะอาด 20 mL (ไม่ใช้น้ำร้อนหรืออุ่นในการผสมยา) แล้วแบ่งผสมเป็นสองครั้ง

- ครั้งแรกเติมพอท่วมผงยาแล้วเขย่าให้เข้ากัน
 - ครั้งที่สองเติมน้ำที่เหลืออยู่จนหมดแล้วเขย่าให้เข้ากัน
- หลังละลายผงยาแล้ว จะได้ยาขวดละ 30 mL

วิธีการเก็บรักษา: ยาที่ผสมพร้อมใช้แล้ว สามารถเก็บได้ทั้งในตู้เย็น ($2-8^{\circ}\text{C}$) และที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 25°C ได้นาน 14 วัน เขย่าขวดก่อนรับประทานยาทุกครั้ง
เอกสารอ้างอิง

-Cefspan® [package insert]. Japan: Astellas Pharma.
-สภาเภสัชกรรม. คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม. 2554. หน้า 109.

สอบถามข้อมูลยาและพิษวิทยา โทร 9 – 7007
สอบถาม Medication Reconciliation (MR) โทร 9 - 6964
สอบถามเรื่องแพ้ยา และประวัติการแพ้ยา โทร 9 - 9555



มีอะไรในฉบับนี้

- ❖ อุปกรณ์ล้างจุกที่มีใน รพ.ศิริราช
- ❖ การบริหารยาฉีด Ivemend®
- ❖ Cefspan® powder for oral suspension ผสมอย่างไร?

ปีที่ 17 ฉบับที่ 4
เดือนมกราคม 2561