

## ยาใหม่: Ledvir® (ledipasvir/sofosbuvir)



ยา ledipasvir/sofosbuvir เป็นยารักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี รายการใหม่ที่มีในโรงพยาบาลศิริราชเมื่อไม่นานมานี้ ส่วนประกอบสำคัญประกอบด้วยตัวยา 2 ชนิด คือ ledipasvir (กลุ่ม nonstructural protein 5A (NS5A) inhibitors) และ sofosbuvir (กลุ่ม NS5B RNA-dependent RNA polymerase inhibitors) ยาทั้งสองชนิดนี้ออกฤทธิ์โดยการรบกวนการเพิ่มจำนวนเชื้อไวรัสตับอักเสบซี

รายการยาที่มีจำหน่ายในโรงพยาบาลศิริราช มีดังนี้

รายการยา	ราคา/กล่อง (28 เม็ด)	สิทธิการเบิกจ่ายยา		
		สปสช.	ปกส.	ข้าราชการ
Ledvir® Tab (ledipasvir 90 mg + sofosbuvir 400 mg)	6,632 บาท	X	X	✓
	เพดานราคาการเบิกจ่าย			6,220 บาท

หมายเหตุ : สำหรับผู้ป่วยสิทธิ สปสช. และประกันสังคม จะได้รับยาที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐโดยตรง

ขนาดยาที่แนะนำ คือ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด ทุก 24 ชั่วโมง

เอกสารอ้างอิง

Product information: Ledvir®, ledipasvir/sofosbuvir, Mylan, Bangalore, India.

## การเจ็จยา nitroglycerin inj



Nitroglycerin injection (Nitroject®) เป็นยาในกลุ่ม nitrates เป็นสารละลายปราศจากเชื้อ บรรจุใน ampoule มีความเข้มข้น 50 mg/10 mL

การเจ็จก่อนบริหารยา

เจ็จเจ็จยานี้ด้วย D5W หรือ NSS ให้มีความเข้มข้นไม่เกิน 400 mcg/mL

ความคงตัวหลังการเจ็จ

หลังเจ็จเจ็จยา Nitroject® ด้วย D5W หรือ NSS มีความคงตัว 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 25 °C

เอกสารอ้างอิง

Product information: Nitroject®, nitroglycerin injection, Sun Pharmaceutical, Gujarat, India.

## การบริหารยาฉีด zoledronic acid

รายการยา zoledronic acid ที่มีจำหน่ายในรพ.ศิริราชมี 3 ชื่อการค้า คือ

1. Zolennic® (4 mg/5 mL)
2. Zometa® (4 mg/100 mL)
3. Aclasta® (5 mg/100 mL)

ความแตกต่างของยา

1. ข้อบ่งใช้ตามการขึ้นทะเบียนยา

ขนาดยา 4 mg: ใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งที่มีการแพร่กระจายไปถึงกระดูก ใช้ในมะเร็ง multiple myeloma ที่มีการทำลายกระดูกโดยใช้ร่วมกับการรักษามาตรฐาน ใช้ในผู้ป่วยที่มีมะเร็งกระจายไปที่กระดูกเพื่อลดการเสื่อมสลายของกระดูก และใช้รักษาภาวะแคลเซียมในเลือดสูงเนื่องจากเนื้องอก

ขนาดยา 5 mg: ใช้สำหรับโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือน และใช้ในโรคกระดูก Paget's disease

2. รูปแบบยา

Zometa® และ Aclasta® เป็นรูปแบบสารละลายพร้อมใช้ 100 mL สามารถนำมาหยดเข้าหลอดเลือดดำในเวลาไม่น้อยกว่า 15 นาทีได้ทันที โดยไม่ต้องเจ็จเจ็จเพิ่ม



Zolennic® เป็นรูปแบบสารละลายเข้มข้น ต้องเจ็จเจ็จก่อนนำไปบริหารให้แก่ผู้ป่วยโดยใช้สารน้ำ NSS หรือ D5W ปริมาตร 100 mL หยดยาเข้าหลอดเลือดดำในเวลาไม่น้อยกว่า 15 นาทีเช่นเดียวกัน

เอกสารอ้างอิง

1. Zometa® [package insert]. Switzerland: Novartis; 2016.
2. Zolennic® [package insert]. Thailand: Siam Bheasach; 2014.
3. Aclasta® [package insert]. Switzerland: Novartis; 2008.

# Terlipressin inj เปลี่ยนแปลง รูปแบบยาและการเก็บรักษา

เรื่องแจ้งจากงานจัดซื้อและคลังเวชภัณฑ์  
อ้างถึงหนังสือที่ ศท 0517.072/เอก1185/2561 เนื่อง  
ด้วยบริษัท เพอร์ริง ฟาร์มาซูติคัลส์ จำกัด ได้แจ้ง  
เปลี่ยนแปลงรูปแบบยาและการเก็บรักษา  
Glypressin® inj ซึ่งมีชื่อสามัญทางยาว่า terlipressin  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รูปแบบยาเดิม Glypressin® Powder	รูปแบบยาใหม่ Glypressin® Solution
	
รูปแบบเก่า ที่ยกเลิกการผลิต	รูปแบบใหม่พร้อมใช้
Powder for injection 1 mg/5 mL	Solution for injection 1 mg/8.5 mL
การเก็บรักษา	
ต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส	2-8 องศาเซลเซียส (เก็บในตู้เย็น)
ราคา	
2,297 บาท	2,297 บาท

# การบริหารยา Herceptin SC®



1 ขวด ประกอบด้วยสารละลาย  
สำหรับฉีดเข้าใต้ผิวหนังความเข้มข้น  
600 mg/5 mL ฉีดทุกๆ 3 สัปดาห์

**ข้อบ่งใช้** มะเร็งเต้านมระยะแรก และระยะแพร่กระจาย  
**วิธีบริหารยา**

- ฉีดยาบริเวณต้นขาตำแหน่งระหว่างสะโพกและหัวเข่า
- ฉีดยาโดยเอียงเข็มทำมุมประมาณ 30 องศากับผิวหนังที่บีบขึ้นมาในแนวยาว
- สามารถฉีดเข้าใต้ผิวหนังในปริมาตร 5 mL ได้ภายในครั้งเดียว เนื่องจากมี recombinant human hyaluronidase (rHuPH20) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ใช้ในการเพิ่มพื้นที่การกระจายตัวและการดูดซึมของยา
- ใช้เวลาในการฉีดยานาน 2 - 5 นาที เมื่อฉีดเสร็จ ค้างเข็มไว้ประมาณ 10 วินาที หลังจากนั้นค่อยๆ ถอนเข็มฉีดยาออก
- การฉีดยาครั้งต่อไปควรห่างจากตำแหน่งเดิมอย่างน้อย 2.5 cm (1 นิ้ว) หรือสลับบริเวณที่ฉีดยาต้นขาซ้ายและขวา

เอกสารอ้างอิง: Product information: Herceptin SC®, trastuzumab, Roche, Bangkok, Thailand.

สอบถามข้อมูลยาและพิษวิทยา โทร 9 – 7007  
สอบถาม Medication Reconciliation (MR) โทร 9 - 6964  
สอบถามเรื่องแพ้ยา และประวัติการแพ้ยา โทร 9 - 9555



มีอะไรในฉบับนี้

- ❖ ยาใหม่: Ledvir®  
(ledipasvir/sofosbuvir)
- ❖ การเจือจางยา nitroglycerin inj
- ❖ การบริหารยาฉีด zoledronic acid
- ❖ Terlipressin inj เปลี่ยนแปลงรูปแบบยาและการเก็บรักษา
- ❖ การบริหารยา Herceptin SC®

ปีที่ 17 ฉบับที่ 10  
เดือนกรกฎาคม 2561