

มาตรการการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ	บุคลากรที่ต้องปฏิบัติ			
	แพทย์	พยาบาล	หน่วย Inhalation	นักกายภาพบำบัด
1. Hand Hygiene ก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย อุปกรณ์ เครื่องช่วยหายใจ และสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วย	✓	✓	✓	✓
2. จัดบุคลากรดูแลผู้ป่วยอย่างเพียงพอ		✓		
3. การใช้ Antibiotic อย่างเหมาะสม	✓			
4. การใช้ยา Stress ulcer prophylaxis อย่างเหมาะสม	✓			
5. ใส่ท่อช่วยหายใจทางปาก (Oral intubation)	✓			
6. ทำความสะอาดปาก ฟัน (Oral care) ด้วยน้ำยาทำลาย เชื้อ 2% Chlorhexidine อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง		✓		
7. Avoid intubation มีระบบการ weaning ที่เหมาะสม	✓			
8. Avoid accidental extubation		✓		
9. จัดให้ผู้ป่วยนอนท่าศีรษะสูง 30-45 องศา	✓	✓		✓
10. วัด Cuff pressure ให้อยู่ระหว่าง 20-30 cm H ₂ O		✓		
11. Gastric overdistension ก่อน feed ทุกครั้งควร		✓		
- ตรวจสอบตำแหน่งของสาย feeding tube				
- ตรวจสอบอาหารที่หลงเหลือในกระเพาะอาหาร หากมี เกิน 50-200 ซีซี ให้เลื่อนหรืองดมื้อนั้นออกไป				
12. เปลี่ยน ventilator circuit ไม่เร็วกว่า 7 วัน			✓	
13. เหน้าที่เกิดจาก Condensate ออกอย่าง aseptic technique		✓	✓	
14. มีระบบการติดตามผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ (Surveillance)		✓		
รวม	5	9	2	1