

ยาที่ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาซัลฟา

ยาในกลุ่ม Antibiotics	ยาในกลุ่ม NSAIDs	ยาในกลุ่มอื่นๆ
Cotrimoxazole (Sulfamethoxazole/trimethoprim เช่น Bactrim <sup>®</sup> , Metrim <sup>®</sup> ) Sulfadiazine	Celecoxib (Celebrex <sup>®</sup> ) Nimesulide (Nidol <sup>®</sup> ) Parecoxib (Dynastat <sup>®</sup> )	❖ Hydrochlorothiazide (HCTZ) ❖ Indapamide (Natrlix SR <sup>®</sup> ) ❖ Probenecid ❖ Sulfacetamide ❖ Sulfasalazine

ยาที่ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ Penicillins

ยาในกลุ่ม Penicillins	1 <sup>st</sup> gen. Cephalosporins	ยาในกลุ่ม Carbapenems
❖ Amoxicillin (รวมถึง Amoxicillin + clavulanate) ❖ Ampicillin (รวมถึง Ampicillin + sulbactam) ❖ Becampicillin ❖ Cloxacillin ❖ Dicloxacillin ❖ Penicillin G ❖ Penicillin V ❖ Piperacillin	❖ Cephalothin ❖ Cefazolin ❖ Cephalexin ❖ Cefadroxil	❖ Imipenem-cilastatin (Tienam <sup>®</sup> ) ไม่ควรใช้ในผู้ที่แพ้ penicillin แบบ anaphylaxis