



ความต้องการของประชาชน เรื่องฉลากยาโรงพยาบาลศิริราช


การเก็บข้อมูล




- กลุ่มเป้าหมาย:
ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย โรงพยาบาลศิริราช
- เครื่องมือ:
แบบสอบถามรูปแบบกระดาษ และอิเล็กทรอนิกส์
- ระยะเวลา:
12-21 ตุลาคม 2558
- ผู้ตอบแบบสอบถาม:
180 คน



ข้อมูลทั่วไป (เพศ/อายุ)



ข้อมูลทั่วไป (ระดับการศึกษา)



ฉลากยาโรงพยาบาลศิริราช




โรงพยาบาลศิริราช			
HN 55-555555	15 ตุลาคม 2558	15:55	
นาย ตัวอย่าง แสนดี			
Fexofenadine Tab 180 mg			
Telfast		60 เม็ด	
รับประทานครั้งละ 1 เม็ด			
วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน			
ยาแก้แพ้ แก้คัน ลดน้ำมูก			
ยานี้อาจทำให้ง่วงซึม ห้ามขับรถหรือทำงานกับเครื่องจักร			
เริ่ม 15 ตุลาคม 2558	ถึง 15 ธันวาคม 2558		
(1/5) แพทย์ ผู้รักษา		122052-150	

e-HIS


โรงพยาบาลศิริราช			
HN 55-555555	15 ต.ค. 2558	15:55	
นาย ตัวอย่าง แสนดี			
TELFAS TAB. **180 MG			60
ชื่อสามัญ FEXOFENADINE			TAB
รับประทานครั้งละ 1 เม็ด			
วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน			
ห้ามกินพร้อมยาลดกรด ควรเว้น 2 ชั่วโมง			
แพทย์ ผู้รักษา			
1/5 [B]			MS2-150

SIOP


1. ท่านอ่านฉลากยาทุกครั้งก่อนหยิบยามากินหรือไม่




2. ปกติท่านอ่านข้อมูลในฉลากยาในประเด็นใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)




3. ถ้าท่านอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมท่านทำอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)




4. ข้อมูลบนฉลากยาในปัจจุบันเพียงพอกับความต้องการของท่านหรือไม่




5. ข้อมูลที่ท่านต้องการให้มีอยู่บนฉลากยา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)



6. ท่านต้องการให้มีข้อบังคับของยาทุกตัวบนฉลากหรือไม่




7. หากข้อบ่งใช้ที่ระบุในฉลากยาไม่ตรงกับโรคที่ท่านเป็น ท่านจะ




8. ท่านต้องการให้มีข้อมูลการห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์หรือให้บุตรบนฉลากยาหรือไม่




9. ท่านต้องการทราบค่าเตือนหรือผลข้างเคียงของยาหรือไม่




10. หากฉลากยาระบุว่า “กินยาต่อเนื่องวันละ 1 ครั้งตอน เช้า” ท่านจะกินยาเมื่อใด




11. ถ้าท่านพบคำเตือน “หยุดยาและพบแพทย์ทันทีเมื่อมีอาการหอบเหนื่อยร่วมกับคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง” บนฉลากยา ท่านจะ




12. ถ้าท่านพบคำเตือน “โปรดแจ้งแพทย์หากเกิดอาการ ไอต่อเนื่องหลังใช้ยา” บนฉลากยาท่านจะ




13. ถ้าท่านพบคำเตือน “กินแล้วอาจง่วงซึม” บนฉลากยา ท่านจะ



14. ถ้าท่านพบคำเตือน “(ดื่มน้ำตามมาก ๆ) หยุดยาและพบแพทย์ทันทีหากมีไข้ ผื่น หรือเจ็บตา เจ็บปาก” บนฉลากยาท่านจะ



15. หากบ่นผลลากยามีข้อความระบุว่า “ใช้ยาต่อเนื่อง กันจนยาหมด” แต่เมื่อท่านใช้ยาไปแล้วเกิดอาการแพ้ยา (ผื่นขึ้น แหน่น้ำออก หายใจไม่ออก) ท่านจะ





True success is not in the learning,
but in its application to the benefit of mankind

HRH Prince Mahidol of Songkla

 โรงพยาบาลศิริราช		
HN 55-555555	15 ตุลาคม 2558	15:55
นาย ตัวอย่าง แสนดี		
Fexofenadine Tab 180 mg		60
ชื่อสามัญ เฟกโซเฟนาดีน		เม็ด
รับประทานครั้งละ 1 เม็ด		
วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน		
ยาแก้แพ้ แก้กัน ลดน้ำมูก		
ยานี้อาจทำให้ง่วงซึม ห้ามขับรถหรือทำงานกับเครื่องจักร		
(1/5) แพทย์ ผู้รักษา	MS2-150	