

# โลน (Crab lice)



นายวิบูลย์ อ่ำเจริญ

รศ.ดร.นพ.สุชุม เจียมตน

คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์

ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

## โลน (Pthirus pubis)


เกิดจากการติดตัวโลน ซึ่งเป็นปรสิต มีชื่อเรียกว่า *Pthirus pubis* มีขนาด 1.5 - 3.8 มม. ขุดผ่านผิวหนัง เพื่อดูดเลือดมักอยู่บริเวณที่มีขนบริเวณหัวหน่าว หรือบริเวณอวัยวะเพศ อาจพบบริเวณอื่นได้ เช่น ขนรักแร้ หนวดเครา ขนคิ้ว หรือที่ขนตาก็เป็นได้

## การติดต่อ

- สามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ ตัวโลนจะอาศัยอยู่บริเวณขนที่หัวหน่าว เมื่อมีเพศสัมพันธ์ตัวโลนจะติดไปยังอีกคนหนึ่ง
- สามารถติดต่อทางอื่นนอกจากเพศสัมพันธ์ได้ เช่น ติดจากบริเวณที่นอน การใส่เสื้อผ้าร่วมกัน หรือการใช้ผ้าเช็ดตัวกับคนที่เป็โรค

## อาการ

- จะมีอาการคันบริเวณที่มีตัวโลนอยู่ เช่น บริเวณขนที่หัวหน่าว



## การวินิจฉัย



- โดยการพบเห็นไข่หรือตัว สามารถมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่าหรืออาจจะใช้แว่นขยายช่วย

## การรักษา

- การตัดขนหรือโกนขน เป็นวิธีที่ได้ผลดี เพราะไม่ต้องทายาหรือสารเคมี จะทำให้ตัวโตนและไข่ ไม่มีที่เกาะยึดและหายไป



## การรักษาด้วยยาทา

- ทายาด้วย Permethrin cream โดยทาบริเวณที่เป็น และทิ้งไว้ 10 นาทีแล้วล้างน้ำออก ไม่ใช้ยานี้ที่บริเวณขนาตา
- สระด้วย Lindane shampoo ใช้สระขนบริเวณที่เป็นทิ้งไว้ 4 นาที แล้วล้างออก ไม่ใช้บริเวณขนาตา ไม่ใช่ในคนที่เป้นลมชัก ไม่ใช้บริเวณที่มีแผลหรือคนท้องหรือเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี
- สระด้วยแชมพูที่มี Pyrethrius ใช้สระขนทิ้งไว้ 10 นาทีแล้วล้างออก

## การป้องกันการแพร่กระจายของโตน

- หลังจากรักษาแล้วยังสามารถกำจัดไข่ที่ยังเหลืออยู่ โดยการใช้เล็บหยิบออก



- ทำความสะอาดสิ่งของ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ผ้าเช็ดตัว และอุปกรณ์เครื่องนอนต่างๆ ที่ใช้ในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ด้วยการซักน้ำร้อนอย่างน้อย 5 นาที สำหรับเครื่องนุ่งห่มที่ซักไม่ได้ เช่น หมอนควรอบแห้ง 50°C นาน 20 นาที หรือเก็บไว้ในถุงพลาสติกปิดปากแน่น อย่างน้อย 14 วัน

- ต้องรักษาคู่นอนด้วย



- จดการมีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะรักษาโรคนี้หาย



- แยกของใช้ส่วนตัว ผ้าขนหนูเช็ดตัว เครื่องนุ่งห่ม และที่นอน ไม่ใช่ของร่วมกับผู้ป่วย

