

Finasteride

ผศ.นพ.รัฐพล ตวงทอง

ผศ.พญ.สุเพ็ญญา วโรทัย

อ.พญ.ดรัลพร ไตรวงศ์วรนาถ

สาขาวิชาโรคเส้นผมและการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม

ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ขนาดยา

ยารับประทานฟินาสเทอไรด์ มี 2 ขนาด

คือ 1 มิลลิกรัม และ 5 มิลลิกรัม



กลไกการออกฤทธิ์

ยาฟินาสเทอไรด์ (Finasteride) เป็นยาในกลุ่ม 5-alpha reductase inhibitors ออกฤทธิ์โดยยับยั้งการสร้างฮอร์โมนเพศชาย Dihydrotestosterone (DHT) ซึ่งมีบทบาทสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะผมบางจากฮอร์โมนและพันธุกรรม

ข้อบ่งชี้การใช้ยา

- โรคต่อมลูกหมากโต
- ภาวะผมบางจากพันธุกรรมและฮอร์โมนเพศชาย (androgenetic alopecia)
- ภาวะฮอร์โมนเพศชายที่มากเกินไปในเพศหญิง
- โรค frontal fibrosing alopecia



ข้อห้ามใช้

- แพ้ส่วนประกอบของยา
- หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร
- ผู้มีโรคตับหรือความผิดปกติของการทำงานของตับ

ห้ามใช้



ผลข้างเคียง

- ความผิดปกติของการแข็งตัวของอวัยวะเพศ(<2.5%)
ความต้องการทางเพศและปริมาณของน้ำกามลดลง
โดยอาการเหล่านี้จะกลับเป็นปกติหลังจากหยุดยา
- เจ็บอวัยวะ
- เต้านมขยายใหญ่ มีก้อน เจ็บเต้านม หรือมีสารคัดหลั่งออกมาจากเต้านม
- มีผื่นแดง



คำแนะนำ

- หญิงที่ยังไม่หมดประจำเดือนต้องคุมกำเนิดขณะรับประทาน Finasteride
เนื่องจากยาอาจส่งผลกระทบต่อเจริญเติบโตของทารกในครรภ์เพศชาย
ให้มีอวัยวะเพศที่ผิดปกติ
- ควรแจ้งแพทย์ในการตรวจร่างกายประจำปีว่ารับประทานยาตัวนี้
เนื่องจากยาจะลดระดับค่ามะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) ให้ต่ำ กว่าปกติ
- ควรงดบริจาคเลือดช่วงที่รับประทานยา

ผมกินยาปลูกผม
Finasteride ครับ

