


เรื่งนารู้เมื่อเด็กต้องคมนาสลบ

คณะกรรมการคลินิกปานแต่กำเนิด ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช

ภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การรักษาปานแต่กำเนิดด้วยเลเซอร์

การรักษาปานแต่กำเนิด ด้วยแสงเลเซอร์ในเด็ก บางรายจำเป็นต้องระงับความรู้สึกด้วยการวางยาสลบเพื่อให้เด็กหลับ ไม่รับรู้ต่อความกลัวและความเจ็บ จึงทำให้แพทย์สามารถทำการรักษาด้วยแสงเลเซอร์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย



เมื่อเด็กต้องถูกวางยาสลบเพื่อรักษาปานแต่กำเนิดด้วยเลเซอร์



การวางยาสลบทำได้อย่างไร

การระงับความรู้สึกด้วยการวางยาสลบ ทำได้ด้วยการให้ยาทางการสูดดม โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลที่มีความชำนาญ ดูแลอย่างใกล้ชิด

การวางยาสลบในเด็ก


การเตรียมตัว

งดน้ำ นม และอาหาร ก่อนการวางยาสลบ 4-6 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการสำลักอาหารในระหว่างการวางยา ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

เด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน

- งดนมแม่ ก่อนการวางยาสลบ 4 ชั่วโมง
- งดนมวัวและอาหารก่อนการวางยาสลบ 6 ชั่วโมง

ผู้ปกครองสามารถให้เด็กดื่มน้ำ น้ำหวาน หรือน้ำผลไม้ที่ไม่มีกากได้ เช่น น้ำแอปเปิ้ล น้ำองุ่น จนถึงเวลา ก่อนเริ่มวางยาสลบ 2 ชั่วโมง



หากเด็กงดนม และ อาหารไม่ได้ตามกำหนด ต้องแจ้งให้พยาบาลห้อง ผ่าตัดทราบทันที โดยระบุ ชนิด ปริมาณ และเวลาที่รับประทาน

กรณีที่เด็กเป็นไข้ไม่สบายใน 1 สัปดาห์ก่อนวันนัดหมาย กรุณาติดต่อปรึกษาศัลนิกรปานแต่กำเนิด ก่อนถึงวันนัดหมายยิงเลเซอร์ในห้องผ่าตัด



สวัสดีค่ะ




การวางยาสลบในเด็ก

ทีมแพทย์และพยาบาลจะ
ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดโดย
มีอุปกรณ์ช่วยติดตาม
ภาวะต่างๆ ได้แก่

✍ เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ โดยติดปั๊มสัญญาณ
เล็กๆ 3 อัน บนหน้าอก และมีสายต่อไปยัง
ตัวเครื่อง

✍ เครื่องวัดความดันเลือดโดยจะพันผ้าสำหรับ
วัดที่แขนหรือขาของเด็ก และบีบลมเข้า
ไปอย่างช้าๆ เด็กอาจรู้สึกแน่นที่แขน
หรือขาขณะวัดช่วงสั้นๆ

✍ เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเม็ดเลือด
แดง โดยติดที่หีบหรือหัวเล็กๆบน
ปลายนิ้วและมีสายต่อไปยังเครื่องวัด



หลังการวางยาสลบ

✍ เด็กจะรู้สึกตัว และถูกเคลื่อนย้ายไปยังห้องพักฟื้น
โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลดูแลต่อเนื่อง

✍ เมื่อเด็กรู้สึกตัวดีจึงจะเริ่มให้ดื่มน้ำ นม หรือ
รับประทานอาหารได้ตามที่แพทย์สั่ง

✍ ดูแลแผลและให้ยาแก่เด็กตามคำแนะนำของแพทย์
และพยาบาล

✍ การรักษาด้วยเลเซอร์ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต
สติปัญญา และ พัฒนาการของเด็ก เด็กอาจร้องไห้
กวน งอแง หรือผื่นร้ายได้ แต่อาการจะหายเป็นปกติ
ใน 1-2 วัน

✍ เด็กสามารถรับวัคซีนได้ตามกำหนด

